

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2018（2019 年更新版）に準拠して作成

胃炎・胃潰瘍治療剤

日本薬局方 レバミピド錠

レバミピド[®]錠100mg「NS」

Rebamipide Tablets 100mg “NS”

剤形	フィルムコート錠
製剤の規制区分	該当しない
規格・含量	1 錠中 日本薬局方レバミピド 100mg
一般名	和名：レバミピド（JAN） 洋名：Rebamipide（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・販売開始年月日	製造販売承認年月日：2009 年 7 月 13 日 薬価基準収載年月日：2009 年 11 月 13 日 販売開始年月日：2009 年 11 月 13 日
製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	発 売 元：科研製薬株式会社 製造販売元：日新製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問 合 せ 窓 口	科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室 フリーダイヤル：0120-519-874 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く） ホームページアドレス： https://www.kaken.co.jp/

本 IF は 2024 年 1 月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ー日本病院薬剤師会ー

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、IF と略す）が誕生した。

1988 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第 2 小委員会が IF の位置付け、IF 記載様式、IF 記載要領を策定し、その後 1998 年に日病薬学術第 3 小委員会が、2008 年、2013 年に日病薬医薬情報委員会が IF 記載要領の改訂を行ってきた。

IF 記載要領 2008 以降、IF は PDF 等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加した IF が速やかに提供されることとなった。最新版の IF は、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情報検索のページ（<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>）にて公開されている。日病薬では、2009 年より新医薬品の IF の情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々の IF が添付文書を補完する適正使用情報として適切に審査・検討している。

2019 年の添付文書記載要領の変更に合わせ、IF 記載要領 2018 が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

2. IF とは

IF は「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IF に記載する項目配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

IF の提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

3. IF の利用にあたって

電子媒体の IF は、PMDA の医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って IF を作成・提供するが、IF の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や IF 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IF の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IF が改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IF の使用にあたっては、最新の添付文書を PMDA の医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V.5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」、「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IF を日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IF は日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には薬機法の広告規則や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR 等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らが IF の内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IF を活用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

(2020 年 4 月改訂)

目 次

I. 概要に関する項目	1	5. 混入する可能性のある夾雑物	4
1. 開発の経緯	1	6. 製剤の各種条件下における安定性	5
2. 製品の治療学的特性	1	7. 調製法及び溶解後の安定性	5
3. 製品の製剤学的特性	1	8. 他剤との配合変化（物理化学的变化）	5
4. 適正使用に関して周知すべき特性	1	9. 溶出性	5
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	1	10. 容器・包装	6
（1）承認条件	1	（1）注意が必要な容器・包装、外観が特殊な 容器・包装に関する情報	6
（2）流通・使用上の制限事項	1	（2）包装	6
6. RMP の概要	1	（3）予備容量	6
II. 名称に関する項目	2	（4）容器の材質	7
1. 販売名	2	11. 別途提供される資材類	7
（1）和名	2	12. その他	7
（2）洋名	2	V. 治療に関する項目	8
（3）名称の由来	2	1. 効能又は効果	8
2. 一般名	2	2. 効能又は効果に関連する注意	8
（1）和名（命名法）	2	3. 用法及び用量	8
（2）洋名（命名法）	2	（1）用法及び用量の解説	8
（3）ステム（stem）	2	（2）用法及び用量の設定経緯・根拠	8
3. 構造式又は示性式	2	4. 用法及び用量に関連する注意	8
4. 分子式及び分子量	2	5. 臨床成績	8
5. 化学名（命名法）又は本質	2	（1）臨床データパッケージ	8
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	（2）臨床薬理試験	8
III. 有効成分に関する項目	3	（3）用量反応探索試験	8
1. 物理化学的性質	3	（4）検証的試験	8
（1）外観・性状	3	（5）患者・病態別試験	9
（2）溶解性	3	（6）治療的使用	9
（3）吸湿性	3	（7）その他	9
（4）融点（分解点）、沸点、凝固点	3	VI. 薬効薬理に関する項目	10
（5）酸塩基解離定数	3	1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	10
（6）分配係数	3	2. 薬理作用	10
（7）その他の主な示性値	3	（1）作用部位・作用機序	10
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	（2）薬効を裏付ける試験成績	10
3. 有効成分の確認試験法、定量法	3	（3）作用発現時間・持続時間	11
IV. 製剤に関する項目	4	VII. 薬物動態に関する項目	12
1. 剤形	4	1. 血中濃度の推移	12
（1）剤形の区別	4	（1）治療上有効な血中濃度	12
（2）製剤の外観及び性状	4	（2）臨床試験で確認された血中濃度	12
（3）識別コード	4	（3）中毒域	13
（4）製剤の物性	4	（4）食事・併用薬の影響	13
（5）その他	4	2. 薬物速度論的パラメータ	13
2. 製剤の組成	4	（1）解析方法	13
（1）有効成分（活性成分）の含量及び添加剤	4	（2）吸収速度定数	13
（2）電解質等の濃度	4	（3）消失速度定数	13
（3）熱量	4	（4）クリアランス	13
3. 添付溶解液の組成及び容量	4	（5）分布容積	13
4. 力価	4		

(6) その他	13	(2) 非臨床試験に基づく情報	18
3. 母集団（ポピュレーション）解析	13	IX. 非臨床試験に関する項目	19
(1) 解析方法	13	1. 薬理試験	19
(2) パラメータ変動要因	13	(1) 薬効薬理試験	19
4. 吸収	14	(2) 安全性薬理試験	19
5. 分布	14	(3) その他の薬理試験	19
(1) 血液－脳関門通過性	14	2. 毒性試験	19
(2) 血液－胎盤関門通過性	14	(1) 単回投与毒性試験	19
(3) 乳汁への移行性	14	(2) 反復投与毒性試験	19
(4) 髄液への移行性	14	(3) 遺伝毒性試験	19
(5) その他の組織への移行性	14	(4) がん原性試験	19
(6) 血漿蛋白結合率	14	(5) 生殖発生毒性試験	19
6. 代謝	14	(6) 局所刺激性試験	19
(1) 代謝部位及び代謝経路	14	(7) その他の特殊毒性	19
(2) 代謝に関与する酵素（CYP 等）の分子種、 寄与率	14	X. 管理的事項に関する項目	20
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	14	1. 規制区分	20
(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比 率	14	2. 有効期間	20
7. 排泄	14	3. 包装状態での貯法	20
8. トランスポーターに関する情報	15	4. 取扱い上の注意	20
9. 透析等による除去率	15	5. 患者向け資材	20
10. 特定の背景を有する患者	15	6. 同一成分・同効薬	20
11. その他	15	7. 国際誕生年月日	20
VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	16	8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準 収載年月日、販売開始年月日	20
1. 警告内容とその理由	16	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容	20
2. 禁忌内容とその理由	16	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその 内容	20
3. 効能又は効果に関連する注意とその理由	16	11. 再審査期間	20
4. 用法及び用量に関連する注意とその理由	16	12. 投薬期間制限に関する情報	20
5. 重要な基本的注意とその理由	16	13. 各種コード	21
6. 特定の背景を有する患者に関する注意	16	14. 保険給付上の注意	21
(1) 合併症・既往歴等のある患者	16	XI. 文献	22
(2) 腎機能障害患者	16	1. 引用文献	22
(3) 肝機能障害患者	16	2. その他の参考文献	22
(4) 生殖能を有する者	16	XII. 参考資料	23
(5) 妊婦	16	1. 主な外国での発売状況	23
(6) 授乳婦	16	2. 海外における臨床支援情報	23
(7) 小児等	17	XIII. 備考	24
(8) 高齢者	17	1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあ たつての参考情報	24
7. 相互作用	17	(1) 粉碎	24
(1) 併用禁忌とその理由	17	(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通 過性	24
(2) 併用注意とその理由	17	2. その他の関連資料	24
8. 副作用	17	(1) 提供用資料	24
(1) 重大な副作用と初期症状	17	(2) GS1 コード	24
(2) その他の副作用	17		
9. 臨床検査結果に及ぼす影響	18		
10. 過量投与	18		
11. 適用上の注意	18		
12. その他の注意	18		
(1) 臨床使用に基づく情報	18		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

レバミピドは防御因子増強剤に分類される胃炎・胃潰瘍治療剤であり、本邦では 1990 年に上市され、広く臨床で使用されている。

レバミピド錠 100mg「NS」は、レバミピドを主成分とする後発医薬品として日新製薬株式会社が開発を企画し、薬食発第 0331015 号（2005 年 3 月 31 日）に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を実施し、2009 年 7 月に承認を得た。

2. 製品の治療学的特性

- 1) レバミピドは、内因性プロスタグランジン増加や胃粘液量増加などによる胃粘膜保護作用、損傷胃粘膜の治癒促進作用が認められている^{1~18)}。（「VI. 2. (1) 作用部位・作用機序」の項参照）
- 2) レバミピドは、フリーラジカル抑制や炎症性サイトカイン産生抑制などにより胃粘膜の炎症を抑制する作用が認められている^{4, 19~27)}。（「VI. 2. (1) 作用部位・作用機序」の項参照）
- 3) 重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、白血球減少、血小板減少、肝機能障害、黄疸が報告されている。（「VIII. 8. (1) 重大な副作用と初期症状」の項参照）

3. 製品の製剤学的特性

該当資料なし

4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、 最適使用推進ガイドライン等	有無
医薬品リスク管理計画（RMP）	無
追加のリスク最小化活動として 作成されている資材	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

(1) 承認条件

該当しない

(2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

6. RMP の概要

該当しない

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

レバミピド錠 100mg 「NS」

(2) 洋名

Rebamipide Tablets 100mg “NS”

(3) 名称の由来

「有効成分名」＋「剤形」＋「規格」＋「屋号」より命名。

2. 一般名

(1) 和名（命名法）

レバミピド（JAN）


(2) 洋名（命名法）

Rebamipide（JAN）

(3) ステム（stem）

不明

3. 構造式又は示性式



及び鏡像異性体

4. 分子式及び分子量

分子式：C₁₉H₁₅ClN₂O₄

分子量：370.79

5. 化学名（命名法）又は本質

(2*RS*)-2-(4-Chlorobenzoylamino)-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl) propanoic acid (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

CAS 登録番号：90098-04-7

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の結晶性の粉末であり、味は苦い。

(2) 溶解性

溶 媒	1g を溶かすのに要する溶媒量	日本薬局方の 溶解度表記
<i>N,N</i> -ジメチルホルムアミド	10mL 以上 30mL 未満	やや溶けやすい
メタノール、エタノール (99.5)	1000mL 以上 10000mL 未満	極めて溶けにくい
水	10000mL 以上	ほとんど溶けない

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

融点：291℃（分解）

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

N,N-ジメチルホルムアミド溶液（1→20）は旋光性を示さない。

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法、定量法

確認試験法：

日本薬局方「レバミピド」の確認試験法による

定量法：

日本薬局方「レバミピド」の定量法による


IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別

フィルムコート錠

(2) 製剤の外観及び性状

性状	白色のフィルムコート錠		
外形			
大きさ	錠径：7.6mm、錠厚：3.6mm、重量：155mg		

(3) 識別コード

NS290（錠剤表面）

(4) 製剤の物性

該当資料なし

(5) その他

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量及び添加剤

有効成分	1錠中 日本薬局方レバミピド 100mg
添加剤	クロスポビドン、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ

(2) 電解質等の濃度

該当しない

(3) 熱量

該当しない

3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

4. 力価

該当しない

5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

6. 製剤の各種条件下における安定性

最終包装製品を用いた加速試験の結果、レバミピド錠 100mg「NS」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された²⁸⁾。

保存条件	包装形態	保存期間	結果
40±1℃ 75±5%RH	PTP 包装 バラ包装（ポリエチレン瓶）	6 ヶ月	適合※

※性状、確認試験、製剤均一性試験（質量偏差試験）、溶出性、定量試験

最終包装製品を用いた長期保存試験の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、レバミピド錠 100mg「NS」の室温保存における 3 年間の安定性が確認された²⁸⁾。

保存条件	包装形態	保存期間	結果
室温	PTP 包装 バラ包装（ポリエチレン瓶）	3 年	適合※

※性状、確認試験、製剤均一性試験（質量偏差試験）、溶出性、硬度、定量試験

7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

8. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当しない

9. 溶出性²⁹⁾

【日本薬局方に基づく試験】

レバミピド錠 100mg「NS」は、日本薬局方医薬品各条に定められたレバミピド錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

【後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 9 年 12 月 22 日付医薬審第 487 号、一部改正：平成 13 年 5 月 31 日付医薬審発第 786 号）に基づく試験】

①試験法：日本薬局方一般試験法溶出試験法 パドル法

②試験条件






試験液量：900mL 測定方法：紫外可視吸光度測定法

各種条件：

試験液	サンプリング時間（分）	回転数
pH1.2	5,10,15,30,45,60,90,120	50rpm
pH5.0	5,10,15,30,45,60,90,120,180,240,300,360	
pH6.8	5,10,15,30,45,60	
水	5,10,15,30,45,60,90,120,180,240,300,360	
pH6.8	5,10,15,30	100rpm
試験液温	37.0±0.5℃	
ベッセル数	12 ベッセル	

③試験結果：レバミピド錠100mg「NS」と標準製剤の溶出挙動は、5条件すべてにおいて基準に適合し、「すべての溶出試験条件において基準に適合する」の判断基準にあてはまったため、両製剤の溶出挙動は同等であると判断された。

IV. 製剤に関する項目



10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当しない

(2) 包装

100 錠 [10 錠 (PTP) × 10]

500 錠 [10 錠 (PTP) × 50]

1050 錠 [21 錠 (PTP) × 50]

500 錠 [バラ]

(3) 予備容量

該当しない

(4) 容器の材質

[PTP 包装製品]

PTP：ポリ塩化ビニル、アルミニウム

個装箱：紙

[バラ包装製品]

瓶：ポリエチレン

個装箱：紙

11. 別途提供される資材類

該当しない

12. その他

該当しない

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

○胃潰瘍

○下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善
急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期

2. 効能又は効果に関連する注意

設定されていない

3. 用法及び用量

（1）用法及び用量の解説

〈胃潰瘍〉

通常、成人には1回1錠（レバミピドとして100mg）を1日3回、朝、夕及び就寝前に経口投与する。

〈下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善

急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期〉

通常、成人には1回1錠（レバミピドとして100mg）を1日3回経口投与する。

（2）用法及び用量の設定経緯・根拠

＜副作用等による減量・中止規定＞

「VIII. 8. 副作用」の項参照

4. 用法及び用量に関連する注意

設定されていない

5. 臨床成績

（1）臨床データパッケージ

該当資料なし

（2）臨床薬理試験

該当資料なし

（3）用量反応探索試験

該当資料なし

（4）検証的試験

1) 有効性検証試験

該当資料なし

2) 安全性試験

該当資料なし

(5) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当資料なし

(7) その他

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

セトラキサート塩酸塩、テブレノン、ソファルコン等

注意：関連のある化合物の効能・効果等は、最新の添付文書を参照すること。

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

1) 胃粘膜保護、損傷治癒促進作用

レバミピドは、内因性プロスタグランジン増加や胃粘液量増加などによる胃粘膜保護作用、損傷胃粘膜の治癒促進作用が認められている^{1~18)}。

2) 胃粘膜の炎症抑制作用

レバミピドは、フリーラジカル抑制や炎症性サイトカイン産生抑制などにより胃粘膜の炎症を抑制する作用が認められている^{4, 19~27)}。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

1) 実験胃潰瘍に対する抑制作用及び治癒促進作用

ラットにおいて、水浸拘束ストレス潰瘍、アスピリン潰瘍、インドメタシン潰瘍、ヒスタミン潰瘍、セロトニン潰瘍、幽門結紮潰瘍及び活性酸素が関与していると考えられる虚血・再灌流、血小板活性化因子 (PAF)、ジエチルジチオカルバメイト (DDC)、ストレス・インドメタシンによる胃粘膜傷害を抑制した^{1, 2, 23, 25)}。また、ラット酢酸潰瘍の治癒を促進し、潰瘍作製後 120~140 日目にみられる再発・再燃を抑制した³⁾。

2) 実験胃炎に対する抑制作用及び治癒促進作用

ラットにおいて、胆汁酸の主成分の一つであるタウロコール酸で誘発した実験胃炎の発生を抑制するとともに治癒促進効果を有した^{4, 5)}。

3) 胃粘膜プロスタグランジン増加作用

ラットにおいて、胃粘膜内プロスタグランジン E₂ 含量を増加させた。また、胃液中のプロスタグランジン E₂、I₂を増加させるとともに、プロスタグランジン E₂の代謝産物である 15-ケト-13,14-ジヒドロプロスタグランジン E₂も増加させた^{6, 7)}。

健康成人男性において、胃粘膜プロスタグランジン E₂ 含量を増加させ、エタノール負荷による胃粘膜傷害に対する抑制作用を示した⁸⁾。

4) 胃粘膜保護作用

ラットにおいて、エタノール、強酸及び強アルカリによる胃粘膜傷害を抑制した^{6, 9)}。

健康成人男性において、アスピリン、エタノール、塩酸・エタノール負荷による胃粘膜傷害を抑制した^{8~10)}。

5) 胃粘液量増加作用

ラットにおいて、粘液高分子糖タンパクの生合成酵素活性を高め、胃粘膜被覆粘液量及び可溶性粘液量を増加させた。なお、可溶性粘液増加作用に内因性プロスタグランジンは関与しなかった^{11~13)}。

6) 胃粘膜血流量増加作用

ラットにおいて、胃粘膜血流量を増加させ、脱血による血行動態の障害を改善した⁹⁾。

7) 胃粘膜関門に対する作用

ラットにおいて、胃粘膜電位差に対してほとんど作用を示さないが、エタノールによる胃粘膜電位差の低下を抑制した¹⁴⁾。

8) 胃アルカリ分泌亢進作用

ラットにおいて、胃アルカリ分泌を亢進した¹⁵⁾。

9) 損傷胃粘膜修復作用

ウサギ培養胃粘膜上皮細胞を用いた創傷修復モデルにおいて、胆汁酸及び過酸化水素によって遅延した修復過程を正常化した^{16, 17)}。

10) 胃酸分泌に対する作用

ラットにおいて、基礎胃液分泌にほとんど作用を及ぼさず、また、刺激胃酸分泌に対しても抑制作用を示さなかった¹⁸⁾。

11) 活性酸素に対する作用

レバミピドはヒドロキシルラジカルを直接消去し、多形核白血球のスーパーオキシド産生を抑制した^{19~21)}。また、*Helicobacter pylori*による好中球からの活性酸素種産生による胃粘膜細胞傷害を抑制した²²⁾ (*in vitro*)。

ストレス・インドメタシンを負荷したラットの胃粘膜傷害を抑制すると同時に胃粘膜中の過酸化脂質含量を低下させた²³⁾。

12) 胃粘膜への炎症性細胞浸潤に対する作用

ラットのタウロコール酸（胆汁酸の主成分の一つ）誘発胃炎モデル、NSAIDs 胃粘膜傷害モデル、虚血-再灌流モデルにおいて、炎症性細胞浸潤を抑制した^{4, 24, 25)}。

13) 胃粘膜における炎症性サイトカイン（インターロイキン-8）に対する作用

*Helicobacter pylori*によるヒト胃粘膜上皮細胞からのインターロイキン-8（IL-8）産生増加を抑制した²⁶⁾。また、上皮細胞内のNF- κ Bの活性化及びIL-8 mRNAの発現を抑制した²⁷⁾ (*in vitro*)。

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 臨床試験で確認された血中濃度

1) 単回投与

健康成人男性 27 例にレバミピド錠 100mg を空腹時単回経口投与した時の薬物動態パラメータを以下に示す³⁰⁾。

レバミピドの薬物動態パラメータ

	$t_{\max}$ (時間)	$C_{\max}$ ($\mu\text{g/L}$)	$t_{1/2}$ (時間)	AUC_{24h} ($\mu\text{g/L} \cdot h$)
レバミピド錠 100mg	2.4 ± 1.2	216 ± 79	1.9 ± 0.7	874 ± 209


(平均値±標準偏差、n=27、 $t_{1/2}$ は12時間までの値より算出した)

2) 生物学的同等性試験

レバミピド錠 100mg 「NS」とムコスタ錠を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（レバミピドとして 100mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、 $C_{\max}$ ）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.8) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両製剤の生物学的同等性が確認された³¹⁾。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC_{0-12} ($\text{ng} \cdot \text{hr/mL}$)	$C_{\max}$ (ng/mL)	$T_{\max}$ (hr)	$T_{1/2}$ (hr)
レバミピド錠 100mg 「NS」	1156.7 ± 362.6	296.8 ± 98.5	2.0 ± 1.0	2.1 ± 0.7
ムコスタ錠 100mg	1123.9 ± 383.1	262.7 ± 94.3	2.5 ± 1.2	1.9 ± 0.5

(Mean±S.D., n=31)



血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

3) 腎機能障害患者

腎機能障害被験者にレバミピド 100mg を単回経口投与後の薬物動態を検討したところ、健康成人に比べ血漿中濃度の上昇及び消失半減期の遅れが認められた³²⁾。

4) 透析患者

透析患者に連続投与したときの定常状態における血漿中濃度は、単回投与時から推定できる血漿中濃度と一致したことにより、蓄積性はないものと考えられた³³⁾。

(3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

健康成人男性 6 例にレバミピド 150mg^{注)} を単回経口投与した時、食事により吸収の遅延傾向がみられたが、バイオアベイラビリティに影響は認められなかった³⁴⁾。

注) 本剤の承認された用量は 1 回 100mg、1 日 3 回である。

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

0.35331±0.09664 (hr⁻¹) (試験製剤単回投与時、平均±標準偏差、n=31)

(4) クリアランス

該当資料なし

(5) 分布容積

該当資料なし

(6) その他

該当資料なし

3. 母集団（ポピュレーション）解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸収

該当資料なし

5. 分布

(1) 血液－脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液－胎盤関門通過性

該当資料なし

(3) 乳汁への移行性

該当資料なし

<参考>

動物実験（ラット）で乳汁中へ移行することが報告されている（「VIII. 8. (5) 妊婦」の項参照）。

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

(6) 血漿蛋白結合率

レバミピドのヒト血漿蛋白結合率は 98.4～98.6%であった³⁵⁾ (*in vitro*、限外ろ過法、0.05～5 μ g/mL)。

6. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2) 代謝に関与する酵素（CYP 等）の分子種、寄与率

「VII. 6. (4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率」の項参照

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

健康成人男性にレバミピド 600mg^{注)}を経口投与した時、尿中排泄の大部分が未変化体であった。代謝産物として 8 位水酸化体が確認されたが、その量は投与量の約 0.03%とわずかであった。8 位水酸化体は CYP3A4 によって生成した^{36, 37)} (*in vitro*)。

注) 本剤の承認された用量は 1 回 100mg、1 日 3 回である。

7. 排泄

健康成人男性にレバミピド 100mg を投与した時、尿中に投与量の約 10%が排泄された³⁷⁾。

8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

9. 透析等による除去率

該当資料なし

10. 特定の背景を有する患者

該当資料なし

11. その他

〈胃潰瘍〉

国内臨床試験

胃潰瘍患者を対象にレバミピド 300mg/日を投与した試験での最終内視鏡判定は、治癒 60% (200/335 例)、略治以上 67% (224/335 例) であった。

また、二重盲検比較試験において、レバミピドの有用性が認められている。

更に、治癒した症例のうち 67 例を 6 カ月間追跡調査した結果、再発が認められた症例は 4 例であり、再発率は約 6%であった^{38~42)}。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

設定されていない

2. 禁忌内容とその理由

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

設定されていない

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

設定されていない

5. 重要な基本的注意とその理由

設定されていない

6. 特定の背景を有する患者に関する注意

（1）合併症・既往歴等のある患者

設定されていない

（2）腎機能障害患者

設定されていない

（3）肝機能障害患者

設定されていない

（4）生殖能を有する者

設定されていない

（5）妊婦

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験（ラット）で胎児への移行が報告されている。

（6）授乳婦

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。

(7) 小児等

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

(8) 高齢者

9.8 高齢者

消化器症状等の副作用に注意すること。一般に生理機能が低下している。

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

(2) 併用注意とその理由

設定されていない

8. 副作用

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(1) 重大な副作用と初期症状

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）

11.1.2 白血球減少、血小板減少（いずれも頻度不明）

11.1.3 肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）

AST、ALT、 γ -GTP、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

(2) その他の副作用

11.2 その他の副作用

	0.1～0.5%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症	発疹	そう痒感、薬疹様湿疹等の過敏症状	蕁麻疹
精神神経系			しびれ、めまい、眠気
消化器	便秘、腹部膨満感、下痢、味覚異常	嘔気、胸やけ、腹痛、げっぷ	口渇、嘔吐
肝臓 ^{注)}		AST、ALTの上昇	γ -GTP、Al-Pの上昇
血液			血小板減少、白血球減少、顆粒球減少
その他		浮腫、咽頭部異物感	乳腺腫脹、乳房痛、女性化乳房、乳汁分泌誘発、動悸、発熱、顔面潮紅、舌のしびれ、咳、息苦しい、脱毛、月経

			異常、BUN 上昇
注) トランスアミナーゼが著しく上昇した場合や発熱、発疹等が同時にあらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。			

9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

10. 過量投与

設定されていない

11. 適用上の注意

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

12. その他の注意

(1) 臨床使用に基づく情報

設定されていない

(2) 非臨床試験に基づく情報

設定されていない

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」の項参照

(2) 安全性薬理試験

該当資料なし

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：該当しない
有効成分：該当しない

2. 有効期間

3 年

3. 包装状態での貯法

室温保存

4. 取扱い上の注意

設定されていない

5. 患者向け資材

くすりのしおり：あり
患者向医薬品ガイド：なし

6. 同一成分・同効薬

同一成分薬：ムコスタ錠 100mg
同 効 薬：セトラキサート塩酸塩、テプレノン、ソファルコン等

7. 国際誕生年月日

1990 年 9 月 28 日（国内開発）

8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

製造販売承認年月日	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
2009 年 7 月 13 日	22100AMX01944000	2009 年 11 月 13 日	2009 年 11 月 13 日

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード

厚生労働省薬価基準収 載医薬品コード	個別医薬品コード (YJ コード)	HOT 番号	レセプト電算処理 システム用コード
2329021F1013	2329021F1145	119379402	621937901

14. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

XI. 文献

1. 引用文献

- 1) 山崎勝也 ほか：薬理と治療.1988 ; 16 (5) : 1997-2005.
- 2) Yamasaki,K.et al. : Jpn J Pharmacol.1989 ; 49 (4) : 441-448. (PMID : 2542684)
- 3) 白木正裕 ほか：日薬理誌.1988 ; 92 (6) : 389-395.
- 4) 岡部 進 ほか：Ther Res.1991 ; 12 (10) : 3253-3263.
- 5) Kishimoto,S.et al. : Res Commun Chem Pathol Pharmacol.1992 ; 78 (3) : 259-277. (PMID : 1335596)
- 6) Yamasaki,K.et al. : Eur J Pharmacol.1987 ; 142 (1) : 23-29. (PMID : 3480223)
- 7) Kleine,A.et al. : Dig Dis Sci.1993 ; 38 (8) : 1441-1449. (PMID : 8393757)
- 8) 中村 肇 ほか：臨床成人病.1989 ; 19 (6) : 1109-1114.
- 9) 川野 淳 ほか：日薬理誌.1991 ; 97 (6) : 371-380.
- 10)Dammann,H.G. : Eur J Gastroenterol Hepatol.1994 ; 6 (10) : 911-915.
- 11)石山広信 ほか：薬理と治療.1988 ; 16 (10) : 4103-4109.
- 12)石山広信 ほか：薬理と治療.1988 ; 16 (10) : 4111-4118.
- 13)Ishihara,K.et al. : Arzneim-Forsch/Drug Res.1992 ; 42 (II) : 1462-1466. (PMID : 1337697)
- 14)山崎勝也 ほか：薬理と治療.1990 ; 18 (9) : 3395-3400.
- 15)山崎勝也 ほか：薬理と治療.1990 ; 18 (10) : 3765-3772.
- 16)Watanabe,S.et al. : Aliment Pharmacol Ther.1996 ; 10 (6) : 927-932. (PMID : 8971290)
- 17)Watanabe,S.et al. : Dig Dis Sci.1998 ; 43 (9) : 107S-112S. (PMID : 9753235)
- 18)山崎勝也 ほか：薬理と治療.1988 ; 16 (6) : 2487-2495.
- 19)Yoshikawa,T.et al. : Arzneim-Forsch/Drug Res.1993 ; 43 (I) : 363-366. (PMID : 8387788)
- 20)Naito,Y.et al. : Free Radic Biol Med.1995 ; 18 (1) : 117-123. (PMID : 7896165)
- 21)Ogino,K.et al. : Eur J Pharmacol.1992 ; 212 (1) : 9-13. (PMID : 1313372)
- 22)Suzuki,M.et al. : Gut.1994 ; 35 (10) : 1375-1378. (PMID : 7959190)
- 23)Yamasaki,K.et al. : Pathophysiology.1994 ; 1 (4) : 251-257.
- 24)Murakami,K.et al. : Dig Dis Sci.1997 ; 42 (2) : 319-325. (PMID : 9052513)
- 25)Kim,C.D.et al. : J Pharmacol Exp Ther.1995 ; 275 (1) : 340-344. (PMID : 7562569)
- 26)三原充弘 ほか：消化器科.1997 ; 24 (6) : 681-688.
- 27)Aihara,M.et al. : Dig Dis Sci.1998 ; 43 (9) : 174S-180S. (PMID : 9753246)
- 28)社内資料：安定性試験
- 29)社内資料：溶出性試験
- 30)Hasegawa,S.et al. : Clin Drug Invest.2003 ; 23 (12) : 771-779. (PMID : 17536891)
- 31)社内資料：生物学的同等性試験
- 32)菊池 博 ほか：新薬と臨床.1995 ; 44 (7) : 1179-1182.
- 33)深沢和浩 ほか：新薬と臨床.1995 ; 44 (10) : 1667-1671.
- 34)岸 清一郎 ほか：臨床成人病.1989 ; 19 (3) : 355-363.
- 35)塩屋良秀 ほか：医薬品研究.1989 ; 20 (2) : 522-533.
- 36)Koyama,N.et al. : XENOBIOTICA.2002 ; 32 (7) : 573-586. (PMID : 12162853)
- 37)第十八改正日本薬局方解説書.東京：廣川書店；2021.C6232-6237
- 38)竹本忠良 ほか：臨床成人病.1989 ; 19 (4) : 539-551.
- 39)竹本忠良 ほか：臨床成人病.1989 ; 19 (4) : 553-582.
- 40)竹本忠良 ほか：臨床成人病.1989 ; 19 (5) : 739-751.
- 41)竹本忠良 ほか：臨床成人病.1989 ; 19 (5) : 753-775.
- 42)竹本忠良 ほか：臨床成人病.1989 ; 19 (7) : 1265-1291.

2. その他の参考文献

特になし

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当しない

2. 海外における臨床支援情報

該当しない

XIII. 備考

1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

(1) 粉碎

個別に照会すること

[問合せ]

科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室

フリーダイヤル：0120-519-874

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

個別に照会すること

[問合せ]

科研製薬株式会社 医薬品情報サービス室

フリーダイヤル：0120-519-874

2. その他の関連資料

(1) 提供用資料

該当資料なし

(2) GS1 コード

包装	GS1 コード	
	調剤包装単位	販売包装単位
100錠 PTP	(01)04987447 290910	(01)14987042 108013
500錠 PTP	(01)04987447 290910	(01)14987042 108044
1050錠 PTP	(01)04987447 290934	(01)14987042 108112
500錠バラ	(01)04987042 108511	(01)14987042 108051

