

# 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領 2018(2019年更新版)に準拠して作成

慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

## トアラセット配合錠「YD」

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠  
TOARASET TABLETS

剤形	フィルムコーティング錠	
製剤の規制区分	劇薬、処方箋医薬品	
規格・含量	1錠中、トラマドール塩酸塩 37.5mg、アセトアミノフェン 325mg 含有	
一般名	和名	洋名
	トラマドール塩酸塩(JAN)	Tramadol Hydrochloride(JAN)
	アセトアミノフェン(JAN)	Acetaminophen(JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載 発売年月日	製造販売承認年月日	2018年8月15日
	薬価基準収載年月日	2018年12月14日
	発売年月日	2018年12月14日
開発・製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元:陽進堂ホールディングス株式会社	
医薬情報担当者の連絡先		
問い合わせ窓口	陽進堂ホールディングス株式会社 お客様相談室 0120-647-734 医療関係者向けホームページ <a href="https://yoshindoholdings.co.jp/">https://yoshindoholdings.co.jp/</a>	

本IFは2024年8月作成(第3版)の添付文書の記載に基づき作成した。最新の添付文書情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ <https://www.pmda.go.jp/> にてご確認下さい。

# 医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ―日本病院薬剤師会―

(2020年4月改訂)

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、IFと略す）が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF記載要領2008以降、IFはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したIFが速やかに提供されることとなった。最新版のIFは、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情報検索のページ（<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>）にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のIFの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切に審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせ、「IF記載要領2018」が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

## 2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IFに記載する項目配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

## 3. IFの利用にあたって

電子媒体のIFは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってIFを作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製薬

企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等，あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに，IFの使用にあたっては，最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお，適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V. 5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」，「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり，その取り扱いには十分留意すべきである。

#### 4. 利用に際しての留意点

IFを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IFは日病薬の要請を受けて，当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する，医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが，記載・表現には医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律の広告規則や販売情報提供活動ガイドライン，製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは，未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について，製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており，MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより，利用者自らがIFの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し，その客観性を見抜き，医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり，IFを利用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

# 目次

I. 概要に関する項目	1	V III. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	22
1. 開発の経緯	1	1. 警告内容とその理由	22
2. 製品の治療学的特性	1	2. 禁忌内容とその理由	22
3. 製品の製剤学的特性	1	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	22
4. 適正使用に関して周知すべき特性	1	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	23
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	1	5. 重要な基本的注意とその理由	23
6. RMP の概要	1	6. 特定の背景を有する患者に関する注意	23
II. 名称に関する項目	2	7. 相互作用	26
1. 販売名	2	8. 副作用	27
2. 一般名	2	9. 臨床検査結果に及ぼす影響	29
3. 構造式又は示性式	2	10. 過量投与	30
4. 分子式及び分子量	2	11. 適用上の注意	30
5. 化学名（命名法）	2	12. その他の注意	30
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3	I X. 非臨床試験に関する項目	32
III. 有効成分に関する項目	4	1. 薬理試験	32
1. 物理化学的性質	4	2. 毒性試験	32
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	X. 管理的事項に関する項目	33
3. 有効成分の確認試験法	4	1. 規制区分	33
4. 有効成分の定量法	4	2. 有効期間	33
I V. 製剤に関する項目	5	3. 包装状態での貯法	33
1. 剤形	5	4. 取扱い上の注意	33
2. 製剤の組成	5	5. 患者向け資材	33
3. 添付溶解液の組成及び容量	6	6. 同一成分・同効薬	33
4. 力価	6	7. 国際誕生年月日	33
5. 混入する可能性のある夾雑物	6	8. 製造販売承認年月及び承認番号、薬価収載年月日、販売開始年月日	33
6. 製剤の各種条件下における安定性	6	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその容用	33
7. 調製法及び溶解後の安定性	7	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	33
8. 他剤との配合変化（物理化学的変化）	7	11. 再審査期間	34
9. 溶出性	7	12. 投薬期間制限に関する情報	34
10. 容器・包装	9	13. 各種コード	34
11. 別途提供される資材類	9	14. 保険給付上の注意	34
12. その他	10	X I. 文献	35
V. 治療に関する項目	11	1. 引用文献	35
1. 効能又は効果	11	2. その他の参考文献	36
2. 効能又は効果に関連する使用上の注意	11	X II. 参考資料	37
3. 用法及び用量	11	1. 主な外国での発売状況	37
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意	11	2. 海外における臨床支援情報	37
5. 臨床試験	12	X III. 備考	38
V I. 薬効薬理に関する項目	16	1. 調剤服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報	38
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	16	2. その他の資料	38
2. 薬理作用	16		
V II. 薬物動態に関する項目	17		
1. 血中濃度の推移	17		
2. 薬物速度論的パラメータ	18		
3. 母集団（ポピュレーション）解析	19		
4. 吸収	19		
5. 分布	19		
6. 代謝	20		
7. 排泄	20		
8. トランスポーターに関する情報	21		
9. 透析等による除去率	21		
10. 特定の背景を有する患者	21		
11. その他	21		

# 略語集

---

なし（個別に各項目において解説する）

# I. 概要に関する項目

## 1. 開発の経緯

トアラセット配合錠「YD」は、1錠中にオピオイド（非麻薬）「トラマドール塩酸塩」37.5mg と解熱鎮痛剤「アセトアミノフェン」325mg を配合した鎮痛剤である。

トアラセット配合錠「YD」は、株式会社陽進堂が後発医薬品として開発を企画し、薬食発 1121 第 2 号（平成 26 年 11 月 21 日）に基づき規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を実施し、平成 30 年 8 月に承認を得て、平成 30 年 12 月発売に至った。

なお、「トアラセット」は、日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会が一般名ルールの適用されない配合剤の後発医薬品向けに商標登録した統一ブランドである。

## 2. 製品の治療学的特性

重大な副作用としてショック、アナフィラキシー、痙攣、意識消失、依存性、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、間質性肺炎、間質性腎炎、急性腎障害、喘息発作の誘発、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、顆粒球減少症、呼吸抑制、薬剤性過敏症症候群があらわれることがある。（「VIII. 安全性（使用上の注意）」に関する項目参照）

## 3. 製品の製剤学的特性

該当しない

## 4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、最適使用推進ガイドライン等	有無
RMP	無
追加のリスク最小化活動としている作成されている資材	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

（2023 年 9 月時点）

## 5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

### （1）承認条件

該当しない

### （2）流通・使用上の制限事項

該当しない

## 6. RMP の概要

該当しない

## II. 名称に関する項目

### 1. 販売名

#### (1) 和名

トアラセット配合錠「YD」

#### (2) 洋名

TOARASET TABLETS

#### (3) 名称の由来

統一ブランド名（日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会）

### 2. 一般名

#### (1) 和名（命名法）

トラマドール塩酸塩（JAN） アセトアミノフェン（JAN）


#### (2) 洋名（命名法）

Tramadol Hydrochloride（JAN） Acetaminophen（JAN）


#### (3) ステム

鎮痛剤：-adol

### 3. 構造式又は示性式



及び鏡像異性体



左：トラマドール塩酸塩 右：アセトアミノフェン

### 4. 分子式及び分子量

トラマドール塩酸塩

分子式：C<sub>16</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>2</sub> · HCl 分子量：299.84

アセトアミノフェン

分子式：C<sub>8</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub> 分子量：151.16

### 5. 化学名（命名法）

トラマドール塩酸塩

(1*RS*, 2*RS*)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol  
monohydrochloride

アセトアミノフェン

*N*-(4-Hydroxyphenyl)acetamide

6. 慣用名、別名、略号、記号番号  
該当しない

## Ⅲ. 有効成分に関する項目

---

### 1. 物理化学的性質

#### (1) 外観・性状

トラマドール塩酸塩：白色の結晶性の粉末である。

アセトアミノフェン：白色の結晶又は結晶性の粉末である。。

#### (2) 溶解性

トラマドール塩酸塩：水に極めて溶けやすく、メタノール、エタノール（95）又は酢酸（100）に溶けやすい。

アセトアミノフェン：メタノール又はエタノール（95）に溶けやすく、水にやや溶けにくく、ジエチルエーテルに極めて溶けにくい。  
水酸化ナトリウム試液に溶ける。

#### (3) 吸湿性

該当資料なし

#### (4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

該当資料なし

#### (5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

#### (6) 分配係数

該当資料なし

#### (7) その他の主な示性値

該当資料なし

### 2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

### 3. 有効成分の確認試験法、定量法

#### 確認試験

トラマドール塩酸塩：(1)紫外可視吸光度測定法

(2)赤外吸収スペクトル測定法（塩化カリウム錠剤法）

(3)塩化物の定性反応（2）

アセトアミノフェン：赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）

#### 定量法

トラマドール塩酸塩：電位差滴定法

アセトアミノフェン：紫外可視吸光度測定法




# I V. 製剤に関する項目

## 1. 剤形

### (1) 剤形の区別

フィルムコーティング錠

### (2) 製剤の外観および性状

販売名		トアラセット配合錠「YD」
剤形		フィルムコーティング錠
色調		淡黄色
直径/厚さ/重量		長径約 15.2 mm/短径約 6.6 mm/ 約 5.2 mm/438 mg
形状	表面	
	裏面	
	側面	

### (3) 識別コード

YD941 (PTP)

### (4) 製剤の物性

該当資料なし

### (5) その他

該当しない

## 2. 製剤の組成

### (1) 有効成分（活性成分）の含量及び添加剤

1錠中の有効成分	トラマドール塩酸塩 37.5mg、アセトアミノフェン 325mg
添加剤	トウモロコシデンプン、セルロース、アルファ化デンプン、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ

### (2) 電解質等の濃度

該当しない

### (3) 熱量

該当しない

### 3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

### 4. 力価

該当しない

### 5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

### 6. 製剤の各種条件下における安定性<sup>24)</sup>

<加速試験>

保存条件	40°C、75%RH	保存期間	6ヶ月間
包装形態①	PTP 包装品		
	ポリ塩化ビニル, アルミニウム箔		
包装形態②	バラ包装品		
	ポリエチレン容器, ポリプロピレンキャップ		

性状	淡黄色の楕円形のフィルムコーティング錠		
確認試験(1) トラマドール塩酸塩	試料溶液のトラマドールのピーク及び標準溶液の主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。		
確認試験(2) アセトアミノフェン	試料溶液のアセトアミノフェンのピーク及び標準溶液の主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。		
含量均一性試験(1) トラマドール塩酸塩	判定値を計算するとき 15.0%を超えない	含量均一性試験(2) アセトアミノフェン	判定値を計算するとき 15.0%を超えない
質量偏差試験(1) トラマドール塩酸塩	判定値を計算するとき 15.0%を超えない	質量偏差試験(2) アセトアミノフェン	判定値を計算するとき 15.0%を超えない
純度試験 (類縁物質)	相対保持時間約 0.14 の類縁物質:標準溶液の 1/50 より大きくない。 アセトアミノフェン由来の個々の類縁物質:標準溶液の 4/25 より大きくない。 その他の個々の類縁物質:トラマドールの標準溶液の 3/10 より大きくない。 アセトアミノフェン由来の類縁物質の総量:標準溶液の 4/5 より大きくない。 その他の類縁物質の総量:トラマドールの標準溶液の 4/5 より大きくない。		
溶出試験(1) トラマドール塩酸塩	30 分間の溶出率は 80%以上	溶出試験(2) アセトアミノフェン	30 分間の溶出率は 80%以上
定量試験(1) トラマドール塩酸塩	95.0~105.0%	定量試験(2) アセトアミノフェン	95.0~105.0%

PTP 包装

3ロット(試験回数 3回/ロット)

試験項目	試験開始時	1ヶ月目	3ヶ月目	6ヶ月目
性状	適合	適合	適合	適合
確認試験(1)	適合	適合	適合	適合
確認試験(2)	適合	適合	適合	適合
純度試験(類縁物質)	適合	適合	適合	適合
含量均一性試験(1)	適合			適合

含量均一性試験(2)	適合			適合
溶出試験(1)	適合	適合	適合	適合
溶出試験(2)	適合	適合	適合	適合
質量偏差試験(1)	適合	適合	適合	適合
質量偏差試験(2)	適合	適合	適合	適合
定量試験(1)	99.2	98.8	99.8	99.4
定量試験(2)	99.0	99.4	100.8	99.1

バラ包装

3ロット (試験回数 3回/ロット)

試験項目	試験開始時	1ヶ月目	3ヶ月目	6ヶ月目
性状	適合	適合	適合	適合
確認試験(1)	適合	適合	適合	適合
確認試験(2)	適合	適合	適合	適合
純度試験(類縁物質)	適合	適合	適合	適合
含量均一性試験(1)	適合			適合
含量均一性試験(2)	適合			適合
溶出試験(1)	適合	適合	適合	適合
溶出試験(2)	適合	適合	適合	適合
質量偏差試験(1)	適合	適合	適合	適合
質量偏差試験(2)	適合	適合	適合	適合
定量試験(1)	99.2	99.2	99.6	99.6
定量試験(2)	99.0	99.8	100.7	99.8

## 7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない


## 8. 他剤との配合変化 (物理化学的变化)

該当資料なし

## 9. 溶出性<sup>2)</sup>

製品名	トアラセット配合錠「YD」 (トラマドール塩酸塩)		
装置	パドル法	温度	37±0.5℃
試験液量	900mL	回転数	50回転
試験液	pH1.2 - 日本薬局方溶出試験第1液      pH3.0 - 薄めたMcIlvaine 緩衝液 pH6.8 - 日本薬局方溶出試験第2液      水 - 日本薬局方精製水		
ガイドライン	後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン		
判定基準	pH1.2、pH3.0、pH6.8、水 標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合、試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。		

装置 (回転数)	試験液	ポイント	平均溶出率		f2	差 (絶対値)
			標準製剤	試験製剤		
パドル法 (50回転)	pH1.2	15分	93.3%	90.7%	-	2.6%
	pH3.0	15分	96.5%	90.3%	-	6.2%
	pH6.8	15分	90.8%	89.5%	-	1.3%
	水	15分	96.1%	92.0%	-	4.1%



製品名	トアラセット配合錠「YD」 (アセトアミノフェン)		
装置	パドル法	温度	37±0.5℃
試験液量	900mL	回転数	50回転
試験液	pH1.2 - 日本薬局方溶出試験第1液 pH6.8 - 日本薬局方溶出試験第2液	pH3.0 - 薄めた McIlvaine 緩衝液 水 - 日本薬局方精製水	
ガイドライン	後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン		
判定基準	pH1.2、pH3.0、pH6.8、水 標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合、試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。		

装置 (回転数)	試験液	ポイント	平均溶出率		f2	差 (絶対値)
			標準製剤	試験製剤		
パドル法 (50回転)	pH1.2	15分	93.3%	90.7%	-	2.6%
	pH3.0	15分	96.5%	90.3%	-	6.2%
	pH6.8	15分	90.8%	89.5%	-	1.3%
	水	15分	96.1%	92.0%	-	4.1%



## 10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報  
該当しない

### (2) 包装

PTP : 100 錠、500 錠

バラ : 500 錠 (プラスチック容器)

### (3) 予備容量

該当しない

### (4) 容器の材質

PTP : アルミニウム箔、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリプロピレン・ポリエチレンラミネートフィルム

バラ : ポリエチレン容器、ポリプロピレンキャップ、ポリエチレン緩衝剤

## 11. 別途提供される資材類

該当資料なし

## 12. その他

該当しない

## V. 治療に関する項目

---

### 1. 効能又は効果

非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛

○非がん性慢性疼痛

○抜歯後の疼痛

### 2. 効能又は効果に関連する使用上の注意

〈非がん性慢性疼痛〉

原因となる器質的病変、心理的・社会的要因、依存リスクを含めた包括的な診断を行い、本剤の投与の適否を慎重に判断すること。

### 3. 用法及び用量

#### (1) 用法及び用量の解説

〈非がん性慢性疼痛〉

通常、成人には、1回1錠、1日4回経口投与する。投与間隔は4時間以上空けること。

なお、症状に応じて適宜増減するが、1回2錠、1日8錠を超えて投与しないこと。また、空腹時の投与は避けることが望ましい。

〈抜歯後の疼痛〉

通常、成人には、1回2錠を経口投与する。

なお、追加投与する場合には、投与間隔を4時間以上空け、1回2錠、1日8錠を超えて投与しないこと。また、空腹時の投与は避けることが望ましい。

#### (2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

### 4. 用法及び用量に関連する使用上の注意

〈非がん性慢性疼痛〉

#### 7.1 投与の継続

本剤投与開始後4週間を経過してもなお期待する効果が得られない場合は、他の適切な治療への変更を検討すること。また、定期的に症状及び効果を確認し、投与の継続の必要性について検討すること。

#### 7.2 投与の中止

本剤の投与を必要としなくなった場合は、退薬症候の発現を防ぐために徐々に減量すること。

#### 7.3 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者に対して本剤を投与する場合は、1回1錠とすること。[9.1.15 参照]

## 5. 臨床成績

### (1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

### (2) 臨床薬理試験

#### 16.1 血中濃度

##### 16.1.1 単回投与

健康成人男性にトラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠 1~3 錠<sup>注)</sup> (トラマドール塩酸塩として 37.5、75 及び 112.5mg、アセトアミノフェン (APAP) として 325、650 及び 975mg) を単回経口投与したとき、投与量にかかわらず、トラマドール【(±) -TRAM】及び APAP は速やかに吸収され、(±) -TRAM 及び APAP の血漿中濃度はそれぞれ投与後約 1~2 時間及び約 1 時間に Cmax に達した後、それぞれ約 5~5.5 時間及び約 3 時間の  $t_{1/2}$  で低下した。両薬物の薬物動態は用量比例性を示した。また、(±) -TRAM は速やかに活性代謝物 O-脱メチルトラマドール【(±) -M1】に代謝され、(±) -M1 の血漿中濃度は投与後約 2 時間に Cmax に達した後、約 6.5 時間の  $t_{1/2}$  で低下した。血漿中 (±) -TRAM 及び (±) -M1 の各鏡像異性体【(+)-体及び (-)-体】の血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータは類似していた<sup>1)</sup>。

トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1~3 錠<sup>注)</sup>を単回経口投与したときの血漿中 (±) -TRAM、(±) -M1 及び APAP の薬物動態パラメータ

対象	トラマドール 塩酸塩 /APAP 配合錠	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	AUC <sub>0-∞</sub> (ng・hr/mL)	$t_{1/2}$ (hr)
(±) -TRAM	1 錠	119.8 (34.3)	1.8 (0.5~3.0)	938.2 (360.7)	5.1 (0.8)
	2 錠	263.8 (45.6)	1.0 (0.5~1.5)	2004.3 (580.5)	5.6 (1.0)
	3 錠 <sup>注)</sup>	424.5 (146.1)	1.3 (1.0~3.0)	3274.3 (1070.4)	5.6 (1.1)
(±) -M1	1 錠	34.2 (10.6)	1.8 (0.5~3.0)	359.4 (63.7)	6.4 (0.9)
	2 錠	65.6 (24.4)	1.8 (1.0~4.0)	680.9 (142.2)	6.3 (0.9)
	3 錠 <sup>注)</sup>	95.7 (26.3)	1.8 (1.0~3.0)	1083.8 (224.3)	6.3 (0.9)
APAP	1 錠	5.0 (2.0) <sup>a</sup>	0.8 (0.5~1.5)	17.1 (4.8) <sup>b</sup>	2.8 (0.6)
	2 錠	9.2 (2.3) <sup>a</sup>	1.0 (0.5~1.5)	38.9 (12.4) <sup>b</sup>	3.3 (0.9)
	3 錠 <sup>注)</sup>	15.1 (4.3) <sup>a</sup>	0.8 (0.5~1.5)	62.3 (18.1) <sup>b</sup>	3.3 (1.0)

a :  $\mu\text{g/mL}$     b :  $\mu\text{g}\cdot\text{hr/mL}$     (n=8、平均値 (標準偏差)、Tmax ; 中央値 (範囲))

注) 本剤の承認された 1 回最高用量は 2 錠である。

### 16.1.2 反復投与

健康成人男性にトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1 回 1 又は 2 錠（トラマドール塩酸塩として 37.5 又は 75mg、APAP として 325 又は 650mg）を 1 日 4 回（6 時間ごと）反復経口投与（トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1 錠：5 日間、トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 2 錠：3 日間）したとき、血漿中（±）-TRAM 及び（±）-M1 濃度は反復経口投与開始後 48 時間までに、また血漿中 APAP 濃度は反復経口投与開始後 24 時間までに定常状態に達しており、蓄積性は認められなかった<sup>1)</sup>。

トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1 回 1 又は 2 錠を 1 日 4 回（6 時間ごと）反復経口投与（トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1 錠：5 日間、トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 2 錠：3 日間）したときの最終投与後の血漿中（±）-TRAM、（±）-M1 及び APAP の薬物動態パラメータ

対象	トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	AUC <sub>0-τ</sub> (ng・hr/mL)	R <sub>A</sub>	t <sub>1/2</sub> (hr)
(±) - TRAM	1 錠	290.6 (72.9)	1.0 (0.5~1.5)	1141.2 (265.8)	1.3 (0.5)	6.6 (1.0)
	2 錠	542.6 (114.4)	1.3 (1.0~2.0)	2355.8 (533.3)	1.3 (0.3)	6.5 (0.6)
(±) - M1	1 錠	78.5 (18.7)	1.3 (0.5~6.0)	325.2 (88.0)	0.9 (0.1)	7.4 (1.4)
	2 錠	142.0 (29.3)	1.3 (0.5~2.0)	666.6 (103.8)	0.9 (0.2)	6.7 (0.9)
APAP	1 錠	6.7 (1.6) <sup>a</sup>	0.5 (0.5~1.0)	17.4 (2.8) <sup>b</sup>	1.0 (0.1)	4.3 (2.7)
	2 錠	11.0 (2.9) <sup>a</sup>	0.8 (0.5~1.5)	30.4 (4.9) <sup>b</sup>	0.9 (0.1)	3.3 (1.1)

(n=8、平均値 (標準偏差)、Tmax ; 中央値 (範囲))

a : μg/mL b : μg・hr/mL RA : 蓄積率 (最終投与後の AUC<sub>0-τ</sub>/初回投与時の AUC<sub>0-∞</sub>)

### 16.1.3 配合による影響

健康成人男性にトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 2 錠（トラマドール塩酸塩として 75mg、APAP として 650mg）、トラマドール塩酸塩 2 カプセル (75mg) 又は APAP 2 カプセル (650mg) をそれぞれ単回経口投与したとき、トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠を投与したときの（±）-TRAM、（±）-M1 及び APAP の薬物動態パラメータは、トラマドール塩酸塩及び APAP をそれぞれ単独で投与したときと同様の値を示し、（±）-TRAM、（±）-M1 及び APAP の薬物動態にトラマドール塩酸塩及び APAP の配合による影響は認められなかった<sup>1)</sup>。

### (3) 用量反応探索試験

該当資料なし

#### (4) 検証的試験

##### 1) 有効性検証試験

###### 〈非がん性慢性疼痛〉

##### 17.1.1 国内第Ⅲ相試験

腰痛症又は変形性関節症と診断され、非ステロイド性消炎鎮痛剤の経口投与により十分な鎮痛効果が得られない慢性疼痛患者 187 例（トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠群 94 例、プラセボ群 93 例）を対象に、非盲検下でトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1 回 1～2 錠を 1 日 4 回 2 週間投与した後、二重盲検期への移行規準を満たした患者に、トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠又はプラセボをランダムに割り付けて 4 週間投与したとき、二重盲検下での鎮痛効果不十分をイベントとしたイベント発生までの期間はプラセボ群と比較しトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠群で有意に長かった（ログランク検定、 $p=0.0001$ ）。

非盲検期の副作用発現率は、79.1%（219/277 例）であった。主な副作用は、悪心 125 例（45.1%）、傾眠 77 例（27.8%）、嘔吐 76 例（27.4%）、便秘 51 例（18.4%）、浮動性めまい 44 例（15.9%）であった<sup>15)</sup>。

##### 17.1.2 国内長期投与試験

各種疾患（腰痛症、変形性関節症、関節リウマチ、頸肩腕症候群、帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害性疼痛など）に伴う慢性疼痛を有し、非ステロイド性消炎鎮痛剤の経口投与により十分な鎮痛効果が得られない患者 190 例を対象に、トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1 回 1～2 錠を 1 日 4 回、適宜増減して非盲検下で最長 52 週間投与したときの VAS 値の平均値は、前観察期の 65.80mm に対して、治療期 28 週には 29.93mm に低下し、その後、治療期 52 週まではほぼ一定の値で推移した。

副作用発現率は、96.3%（183/190 例）であった。主な副作用は、悪心 102 例（53.7%）、便秘 74 例（38.9%）、嘔吐 71 例（37.4%）、浮動性めまい 51 例（26.8%）、傾眠 38 例（20.0%）であった<sup>16)</sup>。

###### 〈抜歯後の疼痛〉

##### 17.1.3 国内第Ⅲ相試験

骨削除及び歯冠分割を必要とする下顎埋伏智歯抜歯術を施行し、抜歯後疼痛を認めた患者 328 例（トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠群 132 例、トラマドール塩酸塩群 66 例、APAP 群 130 例）を対象に、二重盲検下でトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 2 錠、トラマドール塩酸塩 75mg 又は APAP650mg を単回投与したとき、投与後 8 時間までの痛みの改善度の総和（投与後の痛みの改善度を「改善なし」～「完全改善」の 5 段階で、0.5～8 時間まで経時的に評価したときの累積値）の平均値は、トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠群 17.7、トラマドール塩酸塩群 12.4、APAP 群 13.3 であり、トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠群と各単剤群の間に有意差が認められた（Fisher の LSD 法、いずれも  $p<0.0001$ ）。また、トラマ

トラマドール塩酸塩/APAP 配合錠投与後に奏効するまでの時間（痛みの程度が「なし」又は「軽度」に改善するまでの時間）の中央値は約 30 分であり、その後に疼痛が再発した患者における効果持続時間（奏効後に痛みの程度が「中等度」又は「高度」に悪化するまでの時間）の中央値は約 270 分であった。

副作用発現率は、57.6%（76/132 例）であった。主な副作用は、傾眠 39 例（29.5%）、悪心 18 例（13.6%）、浮動性めまい 12 例（9.1%）、嘔吐 9 例（6.8%）であった<sup>17)</sup>。

抜歯後の疼痛における鎮痛効果

薬剤群	解析例数	投与後 8 時間までの痛みの改善度の総和		
		平均値 ±標準偏差	中央値 (最小；最大)	Fisher の LSD 法
トラマドール塩酸塩 /APAP 配合錠 2 錠	132	17.7±7.91	18.5 (0.0；32.0)	p < 0.0001
トラマドール塩酸塩 75mg	66	12.4±8.36	12.5 (0.0；29.5)	
APAP 650mg	130	13.3±8.07	14.0 (0.0；30.5)	p < 0.0001

## 2) 安全性試験

該当資料なし

## (5) 患者・病態別試験

該当資料なし

## (6) 治療的使用

- 1) 使用成績調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容  
該当しない

- 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当しない

## (7) その他

該当しない

## V I . 薬効薬理に関する項目

---

### 1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

トラマドール塩酸塩：塩酸ペンタゾシン、ブプレノルフィン塩酸塩

アセトアミノフェン：イソプロピルアンチピリン、エテンザミド、サリチル酸ナトリウム

### 2. 薬理作用

#### (1) 作用部位・作用機序

##### 18.1 作用機序

##### 18.1.1 トラマドール

ラット脳を用いた *in vitro* 試験の結果から、トラマドールは中枢神経系で作用し、トラマドール及び活性代謝物 M1 の  $\mu$ -オピオイド受容体への結合、並びにトラマドールによるノルアドレナリン及びセロトニンの再取り込み阻害作用が、鎮痛作用に関与すると考えられる<sup>18),19)</sup>。

##### 18.1.2 アセトアミノフェン

ラットを用いた *in vivo* 試験の結果から、アセトアミノフェンは主に中枢神経系で作用し、*N*-メチル-D-アスパラギン酸受容体及びサブスタンス P 受容体を介した一酸化窒素経路の阻害作用、脊髄のセロトニン受容体を介した間接的な作用などが、鎮痛作用に関与すると考えられる<sup>20),21)</sup>。

#### (2) 薬効を裏付ける試験成績

##### 18.2 鎮痛作用

18.2.1 マウスのアセチルコリン誘発ライジングにおいて、トラマドール塩酸塩とアセトアミノフェンの併用経口投与は、アイソボログラムによる解析の結果、相乗的にライジング反応を抑制することが示唆された。ただし、ヒトにおいては本剤の相乗的な鎮痛作用は確認されていない<sup>22)</sup>。

18.2.2 アジュバント関節炎ラットにおいて、トラマドール塩酸塩 (10mg/kg) とアセトアミノフェン (86.7mg/kg) の併用経口投与では、同用量の各薬物単独投与に比べて、温熱性及び機械刺激性痛覚過敏、並びに機械刺激性アロディニアを強く抑制した<sup>23)</sup>。

#### (3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

## V II. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移

#### (1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし


#### (2) 臨床試験で確認された血中濃度<sup>2)</sup>

<トラマドール塩酸塩>

ガイドライン	後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン
概要	トアラセット配合錠「YD」と標準製剤（トラムセット配合錠）をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠（トラマドール塩酸塩として37.5mg）、健康成人男子24名に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定した。
結果	本試験より得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）を統計的に解析したところ、両剤は生物学的に同等と推定された。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-24</sub> (ng・hr/mL)	Cmax(ng/mL)	Tmax(hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
トアラセット配合錠「YD」	655.66±173.52	93.46±17.06	1.56±0.70	4.87±1.01
標準製剤 (錠剤 37.5mg)	646.30±162.20	91.11±17.98	1.63±0.68	5.22±1.80

平均値±標準偏差 n=24




<アセトアミノフェン>

ガイドライン	後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン
概要	トアラセット配合錠「YD」と標準製剤（トラムセット配合錠）をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠（アセトアミノフェンとして325mg）、健康成人男子24名に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定した。
結果	本試験より得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）を統計的に解析したところ、両剤は生物学的に同等と推定された。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-12</sub> ( $\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$ )	Cmax ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	Tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
トアラセット配合錠「YD」	17.72±4.00	5.47±1.57	0.92±0.77	2.84±0.55
標準製剤 (錠剤、325mg)	17.94±4.75	5.75±2.03	0.81±0.45	2.79±0.42

平均値±標準偏差 n=24



(3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

該当資料なし

(4) クリアランス

該当資料なし

(5) 分布容積

該当資料なし

(6) その他

該当資料なし

3. 母集団（ポピュレーション）解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸収

16.2 吸収

16.2.1 食事による影響

健康成人にトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 3 錠<sup>注)</sup>（トラマドール塩酸塩として 112.5mg、APAP として 975mg）を高脂肪食後及び空腹時にそれぞれ単回経口投与したとき、(±)-TRAM、(±)-M1 及び APAP の薬物動態に食事による顕著な影響は認められなかった<sup>3)</sup>（外国人データ）。

注) 本剤の承認された 1 回最高用量は 2 錠である。

5. 分布

(1) 血液－脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液－胎盤関門通過性

該当資料なし

(3) 乳汁への移行性

該当資料なし

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

(6) 血漿蛋白結合率

16.3 分布

ヒト血漿蛋白結合率：(±) -TRAM (0.2~10 μg/mL) 及び APAP (280 μg/mL) 約 20%<sup>4),5)</sup> (*in vitro*)

6. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

16.4 代謝

(±) -TRAM は主に肝臓で CYP2D6 により活性代謝物 (±) -M1 に代謝される。また、その他の主な代謝経路は、肝臓での CYP3A4 による *N*-脱メチル化、グルクロン酸抱合及び硫酸抱合である。APAP の主な代謝経路は、肝臓でのグルクロン酸抱合、硫酸抱合並びに CYP1A2、CYP2E1 及び CYP3A4 による *N*-アセチル-*p*-ベンゾキノニンイミンへの酸化及びそのグルタチオン抱合である<sup>6)~10)</sup>。

(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種、寄与率

V II. 薬物動態に関する項目 6. 代謝 (1) 代謝部位及び代謝経路 参照

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

7. 排泄

16.5 排泄

健康成人男性にトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1~3 錠<sup>注)</sup>を単回経口投与及びトラマドール塩酸塩/APAP 配合錠 1 回 1 又は 2 錠を 1 日 4 回 (6 時間ごと) 反復経口投与したとき、(±) -TRAM、(±) -M1 及び APAP の累積尿中排泄率 (単回: 投与後 48 時間、反復: 最終投与後 48 時間) は、それぞれ投与量の 18.2~20.3%、9.4~14.8%及び 2.5~3.3%であり、投与量及び反復投与による影響は認められなかった<sup>1)</sup>。

注) 本剤の承認された 1 回最高用量は 2 錠である。

8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

9. 透析等による除去率

該当資料なし

10. 特定の背景を有する患者

該当資料なし

11. その他

該当資料なし

## V Ⅲ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### 1. 警告内容とその理由

#### 1. 警告

- 1.1 本剤により重篤な肝障害が発現するおそれがあることに注意し、アセトアミノフェンの1日総量が1500mg（本剤4錠）を越す高用量で長期投与する場合には、定期的に肝機能等を確認するなど、慎重に投与すること。[8.6 参照]
- 1.2 本剤とトラマドール又はアセトアミノフェンを含む他の薬剤（一般用医薬品を含む）との併用により、過量投与に至るおそれがあることから、これらの薬剤との併用を避けること。[13.1、13.2 参照]

### 2. 禁忌内容とその理由

#### 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

##### 〈効能共通〉

- 2.1 12歳未満の小児 [9.7.1 参照]
- 2.2 アルコール、睡眠剤、鎮痛剤、オピオイド鎮痛剤又は向精神薬による急性中毒患者 [中枢神経抑制及び呼吸抑制を悪化させるおそれがある。]
- 2.3 モノアミン酸化酵素（MAO）阻害剤（セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩）を投与中の患者、又は投与中止後14日以内の患者 [10.1 参照]
- 2.4 ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者 [10.1 参照]
- 2.5 治療により十分な管理がされていないてんかん患者 [症状が悪化するおそれがある。] [9.1.1 参照]
- 2.6 消化性潰瘍のある患者 [症状が悪化するおそれがある。]
- 2.7 重篤な血液の異常のある患者 [重篤な転帰をとるおそれがある。] [9.1.8 参照]

##### 〈抜歯後の疼痛〉

- 2.8 アスピリン喘息（非ステロイド製剤による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者 [アスピリン喘息の発症にプロスタグランジン合成阻害作用が関与していると考えられる。] [9.1.11 参照]

### 3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

V. 治療に関する項目 2. 効能又は効果に関連する使用上の注意 参照

### 4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

V. 治療に関する項目 4. 用法及び用量に関連する使用上の注意 参照

## 5. 重要な基本的注意とその理由

### 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤は、1錠中にトラマドール塩酸塩 (37.5mg) 及びアセトアミノフェン (325mg) を含む配合剤であり、トラマドールとアセトアミノフェン双方の副作用が発現するおそれがあるため、適切に本剤の使用を検討すること。
- 8.2 連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。 [11.1.4 参照]
- 8.3 悪心、嘔吐、便秘等の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、悪心・嘔吐に対する対策として制吐剤の併用を、便秘に対する対策として緩下剤の併用を考慮するなど、適切な処置を行うこと。
- 8.4 眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
- 8.5 感染症を不顕性化するおそれがあるので、観察を十分に行うこと。
- 8.6 重篤な肝障害が発現するおそれがあるので注意すること。アセトアミノフェンの1日総量が1500mg (本剤4錠) を超す高用量で長期投与する場合には定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。高用量でなくとも長期投与する場合にあっては定期的に肝機能検査を行うことが望ましい。また、高用量で投与する場合などは特に患者の状態を十分に観察すること。 [1.1、11.1.9 参照]
- 8.7 鎮痛剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意すること。

## 6. 特定の背景を有する患者に関する注意

### (1) 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

##### 〈効能共通〉

- 9.1.1 てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者、あるいは痙攣発作の危険因子 (頭部外傷、代謝異常、アルコール又は薬物の離脱症状、中枢性感染症等) を有する患者 (治療により十分な管理がされていないてんかん患者を除く)  
本剤投与中は観察を十分に行うこと。痙攣発作を誘発することがある。 [2.5 参照]
- 9.1.2 呼吸抑制状態にある患者  
呼吸抑制を増強するおそれがある。
- 9.1.3 脳に器質的障害のある患者  
呼吸抑制や頭蓋内圧の上昇を来すおそれがある。
- 9.1.4 薬物の乱用又は薬物依存傾向のある患者  
厳重な医師の管理下に、短期間に限って投与すること。依存性を生じやすい。
- 9.1.5 オピオイド鎮痛剤に対し過敏症の既往歴のある患者 (本剤の成分に対し過

敏症の既往歴のある患者を除く)

[2.7 参照]

9.1.6 ショック状態にある患者

循環不全や呼吸抑制を増強するおそれがある。

9.1.7 消化性潰瘍又はその既往歴のある患者

消化性潰瘍の再発を促進するおそれがある。

9.1.8 血液の異常又はその既往歴のある患者

症状が悪化又は再発を促すおそれがある。

9.1.9 出血傾向のある患者

血小板機能異常が起こることがある。

9.1.10 心機能異常のある患者

症状が悪化又は心不全が増悪するおそれがある。

9.1.11 気管支喘息のある患者

症状が悪化するおそれがある。 [2.8 参照]

9.1.12 アルコール多量常飲者

肝障害があらわれやすくなる。 [10.2 参照]

9.1.13 絶食・低栄養状態・摂食障害等によるグルタチオン欠乏、脱水症状のある患者

肝障害があらわれやすくなる。

9.1.14 18歳未満の肥満、閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者

投与しないこと。重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがある。

〈非がん性慢性疼痛〉

9.1.15 アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者

本剤を用いず、個別のアセトアミノフェン製剤を用いた用量調節を考慮すること。アスピリン喘息又はその既往歴のある患者では、アセトアミノフェンの1回あたりの最大用量は300mg以下とされているが、本剤は1錠中にアセトアミノフェンを325mg含有している。アスピリン喘息の発症にプロスタグランジン合成阻害作用が関与していると考えられ、症状が悪化又は再発を促すおそれがある。 [7.3 参照]

(2) 腎機能障害患者

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

投与量の減量、投与間隔の延長を考慮すること。症状が悪化又は再発を促すおそれがある。また、高い血中濃度が持続し、作用及び副作用が増強するおそれがある。 [16.6.2 参照]

### (3) 肝機能障害患者

#### 9.3 肝機能障害患者

##### 9.3.1 重篤な肝障害のある患者

投与しないこと。重篤な転帰をとるおそれがある。 [2.6参照]

##### 9.3.2 肝障害のある患者あるいはその既往歴のある患者（重篤な肝障害のある患者を除く）

肝機能が悪化するおそれがある。また、高い血中濃度が持続し、作用及び副作用が増強するおそれがある。 [16.6.1参照]

### (4) 生殖能を有するもの

設定されていない

### (5) 妊婦

#### 9.5 妊婦

##### 9.5.1 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

トラマドールは胎盤関門を通過し、新生児に痙攣発作、身体的依存及び退薬症候、並びに胎児死亡及び死産が報告されている。また、動物実験で、トラマドールは器官形成、骨化及び出生児の生存に影響を及ぼすことが報告されている。

##### 9.5.2 妊娠後期の女性へのアセトアミノフェンの投与により胎児に動脈管収縮を起こすことがある。

##### 9.5.3 アセトアミノフェンは妊娠後期のラットで胎児に軽度の動脈管収縮を起こすことが報告されている。

### (6) 授乳婦

#### 9.6 授乳婦

授乳を避けさせること。トラマドールは、乳汁中へ移行することが報告されている。

### (7) 小児等

#### 9.7 小児等

##### 9.7.1 12歳未満の小児

投与しないこと。海外において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。 [2.1参照]

##### 9.7.2 12歳以上の小児

12歳以上の小児に対する有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

##### 9.7.3 肥満、閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する小児

投与しないこと。重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがある。

## (8) 高齢者

### 9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。生理機能が低下していることが多く、代謝・排泄が遅延し副作用があらわれやすい。

## 7. 相互作用

トラマドールは、主に CYP2D6 及び CYP3A4 によって代謝される。

## (1) 併用禁忌とその理由

### 10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MAO 阻害剤 セレギリン塩酸塩 (エフピー) ラサギリンメシル酸塩 (アジレクト) サフィナミドメシル酸塩 (エクフィナ) [2.3 参照]	外国において、セロトニン症候群（錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢等）を含む中枢神経系（攻撃的行動、固縮、痙攣、昏睡、頭痛）、呼吸器系（呼吸抑制）及び心血管系（低血圧、高血圧）の重篤な副作用が報告されている。MAO 阻害剤を投与中の患者又は投与中止後 14 日以内の患者には投与しないこと。また、本剤投与中止後に MAO 阻害剤の投与を開始する場合には、2～3 日間の間隔を空けることが望ましい。	相加的に作用が増強され、また、中枢神経のセロトニンが蓄積すると考えられる。
ナルメフェン塩酸塩 セリンクロ [2.4 参照]	離脱症状を起こすおそれがある。また、鎮痛作用が減弱するおそれがある。 ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後 1 週間以内の患者には投与しないこと。	$\mu$ オピオイド受容体への競合的阻害による。

## (2) 併用注意とその理由

### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
オピオイド鎮痛剤 中枢神経抑制剤 フェノチアジン系 薬剤 催眠鎮静剤等	痙攣閾値の低下や呼吸抑制の増強を来すおそれがある。	中枢神経抑制作用が相加的に増強されると考えられる。
三環系抗うつ剤 セロトニン作用薬 選択的セロトニン再取り込	セロトニン症候群（錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢	相加的に作用が増強され、また、中枢神経のセロトニンが蓄積すると考えられる。

み阻害剤 (SSRI) 等	等) があらわれるおそれがある。また、痙攣発作の危険性を増大させるおそれがある。	
リネゾリド		リネゾリドの非選択的、可逆的 MAO 阻害作用により、相加的に作用が増強され、また、中枢神経のセロトニンが蓄積すると考えられる。
カルバマゼピン フェノバルビタール フェニトイン プリミドン リファンピシン イソニアジド	トラマドールの血中濃度が低下し作用が減弱する可能性がある。また、これらの薬剤の長期連用者では肝代謝酵素が誘導され、アセトアミノフェン代謝物による肝障害を生じやすくなるとの報告がある。	これらの薬剤の肝代謝酵素誘導作用により、トラマドールの代謝が促進される。また、アセトアミノフェンから肝毒性を持つ <i>N</i> -アセチル- <i>p</i> -ベンゾキノニンイミンへの代謝が促進される。
メチルチオニウム塩化物水和物 (メチレンブルー)	セロトニン症候群 (錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクロヌス、下痢等) があらわれるおそれがある。	メチルチオニウム塩化物水和物のモノアミン酸化酵素阻害作用によりセロトニン作用が増強される。
アルコール (飲酒) [9. 1. 12 参照]	呼吸抑制が生じるおそれがある。また、アルコール多量常飲者がアセトアミノフェンを服用したところ肝不全を起こしたとの報告がある。	相加的に作用が増強されると考えられる。アルコール常飲による CYP2E1 の誘導により、アセトアミノフェンから肝毒性を持つ <i>N</i> -アセチル- <i>p</i> -ベンゾキノニンイミンへの代謝が促進される。
キニジン	相互に作用が増強するおそれがある。	機序不明
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	出血を伴うプロトロンビン時間の延長等のクマリン系抗凝血剤の作用を増強することがある。	機序不明
ジゴキシシン	ジゴキシシン中毒が発現したとの報告がある。	機序不明
オンドанセトロン塩酸塩水和物	本剤の鎮痛作用を減弱させるおそれがある。	本剤の中枢におけるセロトニン作用が抑制されると考えられる。
ブプレノルフィン ペンタゾシン等	本剤の鎮痛作用を減弱させるおそれがある。また、退薬症候を起こすおそれがある。	本剤が作用する $\mu$ -オピオイド受容体の部分アゴニストであるため。
エチニルエストラジオール含有製剤	アセトアミノフェンの血中濃度が低下するおそれがある。	エチニルエストラジオールは肝におけるアセトアミノフェンのグルクロン酸抱合を促進すると考えられる。
	エチニルエストラジオールの血中濃度が上昇するおそれがある。	アセトアミノフェンはエチニルエストラジオールの硫酸抱合を阻害すると考えられる。

## 8. 副作用

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた

場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## (1) 重大な副作用と初期症状

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 ショック、アナフィラキシー（頻度不明）

呼吸困難、喘鳴、血管浮腫、蕁麻疹等があらわれることがある。

#### 11.1.2 痙攣（0.2%）

#### 11.1.3 意識消失（0.2%）

#### 11.1.4 依存性（頻度不明）

長期使用時に、耐性、精神的依存及び身体的依存が生じることがある。本剤の中止又は減量時において、激越、不安、神経過敏、不眠症、運動過多、振戦、胃腸症状、パニック発作、幻覚、錯感覚、耳鳴等の退薬症候が生じることがある。 [8.2参照]

#### 11.1.5 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症（頻度不明）

#### 11.1.6 間質性肺炎（頻度不明）

咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### 11.1.7 間質性腎炎、急性腎障害（頻度不明）

#### 11.1.8 喘息発作の誘発（頻度不明）

#### 11.1.9 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸（頻度不明）

劇症肝炎、AST、ALT、 $\gamma$ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 [8.6参照]

#### 11.1.10 顆粒球減少症（頻度不明）

#### 11.1.11 呼吸抑制（頻度不明）

#### 11.1.12 薬剤性過敏症症候群（頻度不明）

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。なお、ヒトヘルペスウイルス6（HHV-6）等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

## (2) その他の副作用

### 11.2 その他の副作用

	5%以上	1%以上 5%未満	1%未満	頻度不明
感染症及び寄生虫症			腎盂腎炎	

血液及びリンパ系障害		貧血		
代謝及び栄養障害		食欲不振	高脂血症、低血糖症	
精神障害		不眠症	不安、幻覚	錯乱、多幸症、神経過敏、健忘、離人症、うつ病、薬物乱用、インポテンス、悪夢、異常思考、せん妄
神経系障害	傾眠（25.9%）、浮動性めまい（18.9%）、頭痛	味覚異常	筋緊張亢進、感覚鈍麻、錯感覚、注意力障害、振戦、筋不随意運動、第4脳神経麻痺、片頭痛	運動失調、昏迷、会話障害、運動障害
眼障害			視覚異常	縮瞳、散瞳
耳及び迷路障害			耳不快感、耳鳴、回転性めまい	
心臓障害			動悸	不整脈、頻脈
血管障害		高血圧、ほてり		低血圧、起立性低血圧
呼吸器、胸郭及び縦隔障害			呼吸困難、嘔声	
胃腸障害	悪心（41.4%）、嘔吐（26.2%）、便秘（21.2%）、胃不快感	腹痛、下痢、口内炎、口内乾燥、消化不良、胃炎	逆流性食道炎、口唇炎、胃腸障害、腹部膨満、胃潰瘍、鼓腸、メレナ、上部消化管出血	嚥下障害、舌浮腫
肝胆道系障害	肝機能検査異常			
皮膚及び皮下組織障害	そう痒症	発疹、多汗症、冷汗		
腎及び尿路障害		排尿困難	アルブミン尿、尿閉	乏尿
全身障害及び投与局所様態	異常感	口渇、倦怠感、発熱、浮腫	胸部不快感、無力症、悪寒	疲労、胸痛、失神、離脱症候群
臨床検査		体重減少、血中CPK増加、血中尿素増加、血中トリグリセリド増加、血中ビリルビン増加、尿中血陽性、尿中ブドウ糖陽性	好酸球数増加、白血球数増加、ヘモグロビン減少、尿中蛋白陽性、血中クレアチニン増加、血中ブドウ糖増加、血小板数増加、血中クレアチニン減少、血中尿酸増加、好中球百分率増加	
傷害、中毒及び処置合併症			転倒・転落	

## 9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

## 10. 過量投与

### 13.1 症状

トラマドールの過量投与による重篤な症状は、呼吸抑制、嗜眠、昏睡、痙攣発作、心停止である。

アセトアミノフェンの大量投与により、肝毒性のおそれがある。また、アセトアミノフェンの過量投与時に肝臓・腎臓・心筋の壊死が起こったとの報告がある。過量投与による主な症状は、胃腸過敏症、食欲不振、悪心、嘔吐、倦怠感、蒼白、発汗等である。 [1.2 参照]

### 13.2 処置

緊急処置として、気道を確保し、症状に応じた呼吸管理と循環の管理を行うこと。

トラマドールの過量投与による呼吸抑制等の症状が疑われる場合には、ナロキソンが有効な場合があるが、痙攣発作を誘発するおそれがある。また、トラマドールは透析によりほとんど除去されない。

アセトアミノフェンの過量投与による症状が疑われる場合には、アセチルシステインの投与を考慮すること。 [1.2 参照]

## 11. 適用上の注意

### 14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 小児の手の届かない所に保管するよう指導すること。

## 12. その他の注意

### (1) 臨床使用に基づく情報

#### 15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 アセトアミノフェンの類似化合物（フェナセチン）の長期投与により、血色素異常を起こすことがある。

15.1.2 腎盂及び膀胱腫瘍の患者を調査したところ、類似化合物（フェナセチン）製剤を長期・大量に使用（例：総服用量 1.5～27kg、服用期間 4～30年）していた人が多いとの報告がある。

15.1.3 非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。

15.1.4 遺伝的に CYP2D6 の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid Metabolizer）では、トラマドールの活性代謝物の血中濃度が上昇し、呼吸抑制等の副作用が発現しやすくなるおそれがある。

(2) 非臨床試験に基づく情報

15.2 非臨床試験に基づく情報

15.2.1 類似化合物（フェナセチン）の長期・大量投与した動物実験で、腫瘍発生が認められたとの報告がある。

## IX. 非臨床試験に関する項目

---

### 1. 薬理試験

#### (1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」の項参照

#### (2) 安全性薬理試験

該当資料なし

#### (3) その他の薬理試験

該当資料なし

### 2. 毒性試験

#### (1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

#### (2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

#### (3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

#### (4) がん原性試験

該当資料なし

#### (5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

#### (6) 局所刺激性試験

該当資料なし

#### (7) その他の特殊毒性

該当資料なし

## X. 管理的事項に関する項目

---

### 1. 規制区分

製剤：劇薬、処方箋医薬品

原薬：劇薬（トラマドール塩酸塩）、劇薬（アセトアミノフェン）

### 2. 有効期間

有効期間 3 年

### 3. 包装状態での貯法

貯法：室温保存

### 4. 取扱い上の注意

該当しない

### 5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド：あり      くすりのしおり：あり

その他の患者向資材：なし

### 6. 同一成分・同効薬

同一成分：トラムセット配合錠

同効薬：塩酸ペンタゾシン、ブプレノルフィン塩酸塩（トラマドール塩酸塩）

イソプロピルアンチピリン、エテンザミド、サリチル酸ナトリウム（アセトアミノフェン）

### 7. 国際誕生年月日

該当しない

### 8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価収載年月日、販売開始年月日

製造販売承認年月	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
2018 年 8 月 15 日	23000AMX00628000	2018 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日

### 9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月及びその内容

該当しない

### 10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

該当しない

13. 各種コード

厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	HOT (9桁) 番号	レセプト電算 処理システム用コード
1149117F1012	1149117F1101	126480701	622648001

14. 保険給付上の注意

該当しない

# X I . 文 献

---

## 1. 引用文献

### 23. 主要文献

- 1) 国内第 I 相臨床試験（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.6.3)
- 2) (株)陽進堂社内資料：生物学的同等性試験
- 3) 海外第 I 相臨床試験（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.6.2)
- 4) ترامドールの蛋白結合率の検討（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.2.2.1)
- 5) Gazzard, B. G. et al. : J Pharm Pharmacol. 1973 ; 25 : 964-967
- 6) ترامドールの代謝の検討①（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.2.2.1)
- 7) Thummel, K. E. et al. : Biochem Pharmacol. 1993 ; 45 (8) : 1563-1569
- 8) Raucy, J. L. et al. : Arch Biochem Biophys. 1989 ; 271 (2) : 270-283
- 9) Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 11th ed., The McGraw-Hill Companies. 2006 ; 693-695
- 10) ترامドールの代謝の検討②（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.2.3)
- 11) 肝機能障害患者における ترامドールの薬物動態（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.2.3)
- 12) Zapater, P. et al. : Aliment Pharmacol Ther. 2004 ; 20 (1) : 29-36
- 13) 腎機能障害患者における ترامドールの薬物動態（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.2.3)
- 14) Prescott, L. F. et al. : Eur J Clin Pharmacol. 1989 ; 36 (3) : 291-297
- 15) 国内第 III 相試験（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.6.6)
- 16) 国内第 III 相試験（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料概要 2.7.6.17)
- 17) 新谷悟 他：日口腔外会誌. 2012 ; 58 : 110-122
- 18) Raffa, R. B. et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1992 ; 260 (1) : 275-285
- 19) Raffa, R. B. : Am J Med. 1996 ; 101 (suppl 1A) : 40S-46S
- 20) Björkman, R. et al. : Pain. 1994 ; 57 (3) : 259-264
- 21) Pelissier, T. et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1996 ; 278 (1) : 8-14
- 22) Tallarida, R. J. et al. : Life Sciences. 1996 ; 58 (2) : PL-23-PL-28
- 23) アジュバント関節炎ラットにおける ترامドール塩酸塩及びアセトアミノフェン併用投与による鎮痛作用（トラムセット配合錠：2011 年 4 月 22 日承認、申請資料

概要 2.6.2.2.3.2)

24) (株)陽進堂社内資料：安定性資料

## 2. その他の参考文献

該当資料なし

## X II. 参考資料

---

1. 主な外国での発売状況  
該当しない
2. 海外における臨床支援情報  
該当しない

## XⅢ. 備考

---

### 1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

#### (1) 粉碎

個別に照会すること。

照会先：お客様相談室 0120 - 647 - 734

#### (2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

個別に照会すること。

照会先：お客様相談室 0120 - 647 - 734

### 2. その他の資料

該当資料なし

