

貯法：室温保存  
有効期間：3年

承認番号	16100AMZ03950000
販売開始	1986年10月

## 漢方製剤

**コタロー-**

# N319 大柴胡湯去大黃エキス細粒

だい さい こ とう きよ だい おう

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	コタロード大柴胡湯去大黃エキス細粒
有効成分	本剤9.0g中 日局サイコ ..... 6.0g 日局シャクヤク ... 3.0g 日局ハンゲ ..... 4.0g 日局タイソウ ..... 3.0g 日局ショウキョウ .. 1.0g 日局キヅツ ..... 2.0g 日局オウゴン ..... 3.0g 上記の混合生薬より抽出した水製乾燥エキス5.7gを含有する。
添加剤	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム

## 3.2 製剤の性状

剤 形	細粒剤
色 調	茶褐色～黄褐色
味	苦い
におい	特異なにおい
識別コード	N319

## 4. 効能又は効果

みぞおちが硬く張って、胸や脇腹あるいは肝臓部などに痛みや圧迫感があるもの。耳鳴り、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあり、便秘しないもの。  
高血圧、動脈硬化、胃腸病、気管支喘息、黄疸、胆石症、胆囊炎、不眠症、神経衰弱、陰萎、肋膜炎、痔疾、半身不随。

## 6. 用法及び用量

通常、成人1日9.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。  
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。  
8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者  
9.1.1 著しく体力の衰えている患者  
副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。  
9.5 妊婦  
妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。  
9.6 授乳婦  
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。  
9.7 小児等  
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。  
9.8 高齢者  
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

## 20. 取扱い上の注意

- 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。  
20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。  
20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

## 22. 包装

500g [ポリ瓶、バラ]  
3.0g×42包 [分包]  
3.0g×168包 [分包]

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部  
〒531-0071  
大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140  
(9:00～17:30／土、日、祝日、弊社休日を除く)

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号