



カスカラサグラダ流エキス

成分及び分量

本品1ml中にはカスカラサグラダ1g中の可溶性成分を含有する。

効能・効果

便秘症

用法・用量

カスカラサグラダ流エキスとして、通常成人1回1.5mlを1日3回、また、幼児には1回2.25～4.5mlを就寝前又は空腹時に、それぞれ経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

使用上の注意

- (1) 一般的注意
連用による耐性的の増大等のため効果が减弱し薬剤に頼りがちになることがあるので長期連用を避けること。
- (2) 次の患者には投与しないこと
1) 急性腹症が疑われる患者
2) 厳れん性便秘の患者
3) 重症の硬結便のある患者
- (3) 副作用
消化器 ときに嘔吐、腹痛等の症状があらわれることがある。また、長期投与により結腸粘膜に一過性の色素沈着を生じることがある。
- (4) 妊婦・授乳婦への投与
1) 妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有効性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。
2) 子宮収縮を誘発して流早産の危険性があるので、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人は大量投与を避けのこと。
3) ヒト母乳中に移行し乳児の下痢を起こすことがあるので、授乳中の婦人には投与しないことが望ましい。
- (5) その他
本剤の投与により尿が黄褐色又は赤色を呈することがある。

カスカラサグラダ流エキス
2024.02.24 500ml

カスカラサグラダ流エキス
0024 500ml

カスカラサグラダ流エキス
4987523024132
0024