

2013年 7 月 作成（第1版）

貯 法：室温保存
使用期限：3 年（表示の使用期限を参照すること。）

日本標準商品分類番号
873231

承認番号	20100AMZ00268
薬価収載	1989年 5 月
販売開始	1989年 10 月
再評価結果	1977年 10 月

糖類剤

ブドウ糖「ニッコー」

GLUCOSE「NIKKO」

日本薬局方 ブドウ糖

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
ブドウ糖吸収不良の患者

【組成・性状】

1. 組成

本品 1g 中 日局ブドウ糖 1g 含有。

2. 性状

本品は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は甘い。

本品は水に溶けやすく、エタノール(95)に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

【効能・効果】

経口的栄養補給、ブドウ糖負荷試験

【用法・用量】

経口的栄養補給には、必要量を粉末あるいは水溶液として経口投与する。

ブドウ糖負荷試験には、通常成人 1 回ブドウ糖として 50~100g を経口投与する。

なお、年齢、体重により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

(1) カリウム欠乏傾向のある患者 [生体内でブドウ糖が代謝されるときカリウムを消費するので、カリウムが欠乏するおそれがある。]

(2) 糖尿病の患者 [糖尿病の病態を悪化させるおそれがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
消化器 ^注	悪心・嘔吐、下痢、腹痛

注) 大量を経口投与するとき起こすことがあるので慎重に投与すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、減量するなど注意すること。