

貯法：室温保存  
有効期間：3年

**商品番号**  
**J-41**

漢方製剤

**JPS補中益氣湯 エキス顆粒〔調剤用〕****3. 組成・性状****3.1 組成**

販売名	JPS補中益氣湯エキス顆粒〔調剤用〕
有効成分	日局ニンジン ..... 4.0g 日局ソウジュツ ..... 4.0g 日局オウギ ..... 4.0g 日局トウキ ..... 3.0g 日局チンピ ..... 2.0g 日局タイソウ ..... 2.0g 日局サイコ ..... 1.0g 日局カンゾウ ..... 1.5g 日局ショウキョウ ..... 0.5g 日局ショウウマ ..... 0.5g 本剤7.5g中、上記の混合生薬より抽出した日局補中益氣湯エキス4.7gを含有する。
添加剤	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物

**3.2 製剤の性状**

剤形	顆粒剤
色調	淡褐色
におい	特異な芳香
味	わずかに甘味と苦味
識別コード	J-41

**4. 効能又は効果**

元気がなく胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症  
虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ

**6. 用法及び用量**

通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年令、体重、症状により適宜増減する。

**8. 重要な基本的注意**

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。  
8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.2、11.1.3 参照]  
8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

**9. 特定の背景を有する患者に関する注意****9.5 妊婦**

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

**9.6 授乳婦**

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

**9.7 小児等**

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

**9.8 高齢者**

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

**10. 相互作用****10.2 併用注意（併用に注意すること）**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 抑肝散 六君子湯 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アン モニウム・グリシン・L-システィン グリチルリチン酸一アン モニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠等 [8.2、11.1.2、11.1.3 参照]	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパシーがあらわれやすくなる。 グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることと考えられる。	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることと考えられる。

**11. 副作用**

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

**11.1 重大な副作用****11.1.1 間質性肺炎（頻度不明）**

咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。

**11.1.2 偽アルドステロン症（頻度不明）**

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

**11.1.3 ミオパシー（頻度不明）**

低カリウム血症の結果としてミオパシーがあらわれことがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

**11.1.4 肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）**

AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

**11.2 その他の副作用**

	頻度不明
過敏症	発疹、蕁麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、恶心、下痢等

**15. その他の注意****15.1 臨床使用に基づく情報**

湿疹、皮膚炎等が悪化することがある。

**20. 取扱い上の注意**

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

**22. 包装**

750g (2.5g×300包)

105g (2.5g×42包)

**24. 文献請求先及び問い合わせ先**

ジェーピーエス製薬株式会社 営業部

〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-22

TEL 045-593-2060

**26. 製造販売業者等****26.1 製造販売元**

 ジェーピーエス製薬株式会社

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1