

貯法：室温保存  
有効期間：3年

**商品番号**  
**J-18**

**漢方製剤**

劇薬（但し、2.5g包装の分包品は除く）

**JPS 桂枝加朮附湯 エキス顆粒〔調剤用〕****3. 組成・性状****3.1 組成**

販売名	JPS桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤用〕
有効成分	日局ケイヒ ..... 4.0g 日局シャクヤク ..... 4.0g 日局タイソウ ..... 4.0g 日局ショウキョウ ..... 1.0g 日局カンゾウ ..... 2.0g 日局ソウジュツ ..... 4.0g 日局ブシ末 ..... 1.0g 本剤7.5g中、上記の混合生薬より抽出した桂枝加朮附湯乾燥エキス5.0gを含有する。
添加剤	ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エチル、乳糖水和物

**3.2 製剤の性状**

剤形	顆粒剤
色調	淡褐色
におい	特異な芳香
味	わずかに甘味と苦味
識別コード	J-18

**4. 効能又は効果**

関節痛、神経痛

**6. 用法及び用量**

通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年令、体重、症状により適宜増減する。

**8. 重要な基本的注意**

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。  
 8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血压値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2 参照]  
 8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

**9. 特定の背景を有する患者に関する注意****9.1 合併症・既往歴等のある患者****9.1.1 体力の充実している患者**

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

**9.1.2 暑がりで、のぼせが強く、赤ら顔の患者**

心悸亢進、のぼせ、舌のしづれ、恶心等があらわれるおそれがある。

**9.5 妊婦**

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。本剤に含まれるブシ末の副作用があらわれやすくなる。

**9.6 授乳婦**

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

**9.7 小児等**

慎重に投与すること。本剤にはブシ末が含まれている。

**9.8 高齢者**

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

**10. 相互作用****10.2 併用注意（併用に注意すること）**

葉剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益氣湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-시스ティン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠等	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低ウム排泄促進作用として、ミオパチーがあらわれやすくなる。	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム血症の結があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
[8.2、11.1.1、11.1.2 参照]		

**11. 副作用**

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

**11.1 重大な副作用****11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）**

低カリウム血症、血压上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

**11.1.2 ミオパチー（頻度不明）**

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

**11.2 その他の副作用**

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、瘙痒等
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしづれ、恶心等

**20. 取扱い上の注意**

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

**22. 包装**

500g  
750g (2.5g×300包)  
105g (2.5g×42包)

**24. 文献請求先及び問い合わせ先**

ジェーピーエス製薬株式会社 営業部  
〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-22  
TEL 045-593-2060

**26. 製造販売業者等****26.1 製造販売元**

 **ジェーピーエス製薬株式会社**  
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1