

貯法：室温保存
有効期間：3年

承認番号 16100AMZ04770000

販売開始 1987年10月

SG-30

漢方製剤

劇薬（500gボトルのみ）

JPS真武湯エキス顆粒〔調剤用〕

しんぶとう
（真武湯）

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	JPS真武湯エキス顆粒〔調剤用〕
有効成分	本剤は1日量7.5g中、下記の混合生薬より抽出した日局真武湯エキス2.6gを含有する。 日局ブクリョウ 5.0g 日局シャクヤク 3.0g 日局ソウジュツ 3.0g 日局ショウキョウ 1.0g 日局ブシ末 1.0g
添加剤	乳糖水和物、ステアリン酸Mg、シヨ糖脂肪酸エステル

3.2 製剤の性状

剤形	顆粒剤
色調	淡かった色
におい	特異の芳香
味	わずかに苦味
識別コード	SG-30

4. 効能又は効果

新陳代謝が沈衰しているものの次の諸症

諸種の熱病、内臓下垂症、胃腸弛緩症、慢性腸炎、慢性腎炎、じんましん、湿疹、脳出血、脊髄疾患による運動および知覚麻痺

6. 用法及び用量

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 体力の充実している患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

9.1.2 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者

心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。本剤に含まれるブシ末の副作用があらわれやすくなる。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

慎重に投与すること。本剤にはブシ末が含まれている。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

20. 取扱い上の注意

- 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g〔ボトル〕
735g（2.5g×294包）〔分包〕

24. 文献請求先及び問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
TEL 06-6629-9058 FAX 06-6629-9070
HP <https://ohsugi-kanpo.co.jp/>

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

ジェーピーエス製薬株式会社
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

26.2 発売元

大杉製薬株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2