

貯法：室温保存
有効期間：3年

承認番号	21900AMX01721000
販売開始	1984年6月

眼科用表面麻酔剤
オキシブプロカイン塩酸塩点眼液
ネオベノール点眼液0.4%
NEOVENOL Ophthalmic Solution

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

2.1 本剤の成分又は安息香酸エステル(コカインを除く)系局所麻酔剤に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状**3.1 組成**

販売名	ネオベノール点眼液0.4%
有効成分	1mL中 日局 オキシブプロカイン塩酸塩 4mg
添加剤	ポリビニルアルコール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、酢酸、酢酸ナトリウム水和物、等張化剤

3.2 製剤の性状

販売名	ネオベノール点眼液0.4%
pH	4.0~5.0
浸透圧比	約1
性状	無色~微黄褐色澄明、無菌水性点眼剤

4. 効能又は効果

眼科領域における表面麻酔

5. 効能又は効果に関連する注意

鎮痛のみの目的に使用しないこと。

6. 用法及び用量

通常成人では1~4滴を点眼する。

なお、年齢、体質により適宜増減する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意**9.5 妊婦**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、使用上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

使用上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用**11.1.1 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)**

悪心、顔面蒼白、紅斑、発疹、呼吸困難、血圧低下、眼瞼浮腫等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	過敏症状
眼	角膜びらん

14. 適用上の注意**14.1 薬剤投与時の注意**

- ・角膜障害等の副作用をおこすことがあるので、頻回に使用しないこと。
- ・本剤に含まれているベンザルコニウム塩化物はソフトコンタクトレンズに吸着されることがあるので、ソフトコンタクトレンズを装着している場合には、点眼前にレンズを外し、点眼後少なくとも5~10分間の間隔をあけて再装着すること。
- ・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔を空けてから点眼すること。
- ・鎮痛等を目的とした使用を防止するため、患者には渡さないこと。

16. 薬物動態**16.3 分布**

ウサギ摘出角膜を1%オキシブプロカイン塩酸塩液に3分間浸した後に組織の薬物濃度を測定すると、角膜上皮では70.6mg/100mL、角膜実質では7.55mg/100mLであり、上皮では実質の約10倍の取り込みが認められた。

また、同様にウサギ摘出角膜を1%オキシブプロカイン塩酸塩液に3分間浸した後、1分、15分及び30分放置してから角膜中の薬物濃度を測定すると、1分放置後では21.95mg/100mL、15分放置後では1分値の約1/3の7.39mg/100mLとなり、30分放置後では4.24mg/100mLにまで低下した(*in vitro*)¹⁾。

16.4 代謝

ヒト血清にオキシブプロカイン塩酸塩を加え37℃でインキュベートすると、N-ジエチルアミノエタノールと3-プトキシ-4-アミノ安息香酸に速やかに分解された(*in vitro*)²⁾。

17. 臨床成績**17.1 有効性及び安全性に関する試験****17.1.1 国内臨床試験**

白内障外摘出術、虹彩切除術、切裂術、水晶体嚢虹彩切開術等の諸種内眼手術施行例22例を対象に、局所麻酔剤として0.4%オキシブプロカイン塩酸塩点眼液を2分おきに6~7滴点眼し、血管収縮剤として1000倍アドレナリン液を併用して内眼手術を行った結果、十分無痛に手術を行うことができた。副作用は認められなかった³⁾。

18. 薬効薬理**18.1 作用機序**

神経細胞膜のNa⁺チャネルを抑制することによって神経の活動電位発生を抑制するという局所麻酔薬共通の作用により、知覚神経の求心性伝導を抑制する⁴⁾。

18.2 麻酔作用**18.2.1 麻酔効果の発現及び持続時間**

健康人5例10眼に0.4%オキシブプロカイン塩酸塩点眼液を1滴点眼し、Freyの角膜知覚測定法に従い3g/mm²の圧迫力をもつ毛髪で角膜中央部を圧迫したときの角膜知覚消失を基準として麻酔効果を判定した。その結果、0.4%オキシブプロカイン塩酸塩点眼液の麻酔効果発現時間は平均16秒、麻酔持続時間は平均13分51秒であった⁵⁾。

18.2.2 表面麻酔強度

ウサギ角膜麻酔法においてオキシブプロカイン塩酸塩の表面麻酔強度はコカインの約20倍であった⁶⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：オキシブプロカイン塩酸塩(Oxybuprocaine Hydrochloride)

化学名：2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butyloxybenzoate monohydrochloride


分子式：C₁₇H₂₈N₂O₃・HCl

分子量：344.88

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は塩辛く、舌を麻痺する。水に極めて溶けやすく、エタノール(95)又はクロロホルムに溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。1.0gを水10mLに溶かした液のpHは5.0～6.0である。光によって徐々に着色する。

融点：158～162℃

構造式：



22. 包装

プラスチック点眼容器 5mL×10本

23. 主要文献

- 1) Schlegel HE, et al. : Arch Ophthalmol. 1954 ; 51 : 663-670
- 2) Iselin H, et al. : Schweiz Med Wschr. 1966 ; 96 : 219-222
- 3) 亀井俊郎：日本眼科学会雑誌. 1964 ; 68 : 151-153
- 4) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店. 2021 : C1220-C1223
- 5) 岡村治彦：日本眼科学会雑誌. 1962 ; 66 : 557-562
- 6) Büchi J, et al. : Helv Chim Acta. 1951 ; 34 : 1002-1013

24. 文献請求先及び問い合わせ先

ロートニッテン株式会社 医薬情報問合せ窓口
〒457-0038 名古屋市南区桜本町40番地の2
TEL : 0120-691-910 FAX : 052-823-9115

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

RN ロートニッテン株式会社
名古屋市南区桜本町40番地の2