

5α-還元酵素Ⅱ型阻害薬  
男性型脱毛症用薬

劇薬  
処方箋医薬品<sup>注)</sup>

フィナステリド錠 0.2mg「SN」  
フィナステリド錠 1mg「SN」

Finasteride  
フィナステリド錠

	0.2mg	1mg
承認番号	22800AMX00349	22800AMX00350
薬価収載	薬価基準未収載	
*販売開始	2016年12月	

貯 法：室温保存  
使用期限：外箱等に表示

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁 忌】(次の患者には投与しないこと)

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人(「重要な基本的注意」, 「妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与」の項参照)

【組成・性状】

販 売 名	フィナステリド錠 0.2mg「SN」	フィナステリド錠 1mg「SN」				
成分・含量	1錠中 フィナステリド0.2mg	1錠中 フィナステリド1.0mg				
添 加 物	結晶セルロース, 乳糖水和物, 軽質無水ケイ酸, クロスカ ルメロースナトリウム, ヒドロキシプロピルセルロース, ステアリン酸マグネシウム, ヒプロメロース, マクロゴール 6000, タルク, 三酸化鉄, カルナウバロウ					
剤 形	うすい赤色のフィルムコーティング錠					
外 形	表	側面	裏	表	側面	裏
	直径約7.2mm, 厚さ約3.3mm, 重量約125mg		直径約7.2mm, 厚さ約3.3mm, 重量約125mg			
識別コード	FNAL		FNAH			

【効能・効果】

男性における男性型脱毛症の進行遅延

<効能・効果に関連する使用上の注意>

1. 男性における男性型脱毛症のみの適応である。他の脱  
毛症に対する適応はない。
2. 20歳未満での安全性及び有効性は確立されていない。
3. 女性に対する適応はない。

[海外のフィナステリド製剤で実施した閉経後女性の  
男性型脱毛症を対象とした12ヵ月間のプラセボ対照  
二重盲検比較試験(n=137)において、フィナステ  
リドの有効性は認められなかった。]

【用法・用量】

男性成人には、通常、フィナステリドとして0.2mgを1日  
1回経口投与する。なお、必要に応じて適宜増量できるが、  
1日1mgを上限とする。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

3ヵ月の連日投与により効果が発現する場合もあるが、  
効果が確認できるまで通常6ヵ月の連日投与が必要で  
ある。また、効果を持続させるためには継続的に服用  
すること。なお、増量による効果の増強は、確認され  
ていない。

本剤を6ヵ月以上投与しても男性型脱毛症の進行遅延  
がみられない場合には投薬を中止すること。また、6ヵ  
月以上投与する場合であっても定期的に効果を確認し、  
継続投与の必要性について検討すること。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

肝機能障害のある患者

[本剤は主に肝臓で代謝されるが、肝機能障害のある患  
者に投与した場合の安全性は確認されていない。]

2. 重要な基本的注意

本剤の使用に際しては、患者に次の事項を説明すること。

- (1) 本剤を妊婦に投与すると、本剤の薬理作用(DHT低下  
作用)により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影  
響を及ぼすおそれがある。(「妊婦, 産婦, 授乳婦等へ  
の投与」の項参照)
- (2) 本剤を分割・粉砕しないこと。

本剤が粉砕・破損した場合、妊婦又は妊娠している可  
能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。  
本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたり  
しない限り、通常の取扱いにおいて有効成分に接触  
することはない。(「妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与」  
の項参照)

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調  
査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

肝機能障害：肝機能障害があらわれることがあるので、  
観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与  
を中止するなど適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与  
を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻 度 不 明
過 敏 症	そう痒症, 蕁麻疹, 発疹, 血管浮腫(口唇, 舌, 咽 喉及び顔面腫脹を含む)
** 生 殖 器	睾丸痛, 血精液症, 男性不妊症・精液の質低下(精 子濃度減少, 無精子症, 精子運動性低下, 精子形態 異常等) <sup>注1)</sup> , リビドー減退 <sup>注2)</sup> , 勃起機能不全 <sup>注2)</sup> , 射 精障害 <sup>注2)</sup> , 精液量減少
肝 臓	AST(GOT)上昇, ALT(GPT)上昇, γ-GTP上昇
そ の 他	乳房圧痛, 乳房肥大, 抑うつ症状, めまい

注1) フィナステリド製剤の投与中止後に、精液の質が正常化又は  
改善されたとの報告がある。

注2) フィナステリド製剤の市販後において、投与中止後も持続し  
たとの報告がある。

4. 高齢者への投与

前立腺肥大症患者を対象にしたフィナステリド製剤  
(5mg)の臨床試験では、高齢者と非高齢者において副  
作用発現率に明らかな差は認められていない。しかし、  
一般に高齢者では生理機能が低下しているので注意す  
ること。

[高齢者における有効性は確立していない。]

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔重要な基本的注意〕の項参照)
- (2) 授乳中の婦人には投与しないこと。  
[本剤がヒト乳汁中へ移行するかは不明である。]

6. 小児等への投与

小児等に対する適応はない。  
[小児等に対する安全性及び有効性は確立していない。]

7. 臨床検査結果に及ぼす影響

国内のフィナステリド製剤で実施した24歳から50歳の男性型脱毛症患者において、血清前立腺特異抗原 (PSA) の濃度が約40%低下した。海外のフィナステリド製剤の臨床試験において、高齢層の前立腺肥大症患者へのフィナステリド投与により血清PSA濃度が約50%低下した。したがって、本剤投与中の男性型脱毛症患者に対し前立腺癌診断の目的で血清PSA濃度を測定する場合は、2倍した値を目安として評価すること。

8. 適用上の注意

(1) 調剤及び服用時

本剤を分割・粉砕しないこと。  
本剤が粉砕・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。

(2) 薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること (PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜に刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)。

(3) 本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。

9. その他の注意

- (1) 市販後において、フィナステリド製剤を投与された患者で男性乳癌が報告されている。フィナステリド長期投与と男性乳癌の発現との因果関係は不明である。(参考)

海外で実施された、3,047例 (平均年齢: 63歳) の前立腺肥大症患者を対象としたプラセボ及び比較対照薬との4~6年間のフィナステリド製剤の臨床試験において、フィナステリド5mg投与群 (本剤承認用量の5~25倍用量) で4例の乳癌の報告があったが、フィナステリド非投与群ではみられなかった。一方、別の3,040例 (平均年齢: 64歳) の前立腺肥大症患者を対象としたプラセボとの4年間のフィナステリド製剤の海外臨床試験では、プラセボ投与群において2例の乳癌の報告があったが、フィナステリド5mg投与群ではみられなかった。また、18,882例 (平均年齢: 63歳) の健康男性を対象としたプラセボとの7年間のフィナステリド製剤の海外臨床試験では、フィナステリド5mg投与群及びプラセボ投与群で各1例ずつ乳癌の報告があった。なお、海外のフィナステリド製剤の市販後において、フィナステリド1日5mgを投与された患者で男性乳癌が報告されている。

- (2) 海外で実施された、18,882例 (平均年齢: 63歳) の健康男性を対象としたフィナステリド製剤5mg (本剤承認用量の5~25倍用量) 又はプラセボを7年間投与する臨床試験において、Modified Gleason Score<sup>®</sup> 8~10の高悪性度前立腺癌の発現率が、プラセボ投与群 (1.1%) と比較して、フィナステリド製剤5mg投与群 (1.8%) で高かった (相対リスク 1.70 [95%信頼区間: 1.23-2.34]) との報告がある。  
※組織学的悪性度の指標

- (3) フィナステリド製剤の海外臨床試験において、本剤投与により前立腺容積が減少したとの報告がある。
- (4) アカゲザルの妊娠20日から100日までフィナステリド120ng/kg/dayを毎日静脈内投与した場合でも雌雄胎児に異常所見は認められなかった。(アカゲザルへの投与量は、フィナステリド1mgが投与された患者の1回の射精を介して女性が曝露される可能性のあるフィナステリド量の少なくとも750倍に相当する。)

【薬物動態】

生物学的同等性試験<sup>1)</sup>

(1) フィナステリド錠0.2mg「SN」


フィナステリド錠0.2mg「SN」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン (平成24年2月29日薬食審査発0229第10号)」に基づき、フィナステリド錠1mg「SN」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。

(2) フィナステリド錠1mg「SN」

フィナステリド錠1mg「SN」と標準製剤を、クロソオーバー法によりそれぞれ1錠 (フィナステリドとして1mg) 健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中フィナステリド濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC, Cmax) について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	AUC <sub>0-24</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
フィナステリド錠 1mg「SN」	44.66 ±9.79	7.90 ±1.52	1.75 ±0.93	4.28 ±1.17
標準製剤 (錠剤, 1mg)	46.88 ±11.96	7.70 ±2.24	1.98 ±1.02	4.50 ±0.94

(mean ± S.D., n=20)



血漿中濃度並びにAUC, Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

【薬効薬理】<sup>2)</sup>

フィナステリドは5α-還元酵素II型阻害薬で、テストステロンからジドロテストステロンへの変換を選択的に阻害する。男性型脱毛症の主な原因であるジドロテストステロンの生成を阻害することにより、発毛作用などを示すと考えられる。

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名: フィナステリド

Finasteride [JAN]

化学名: (-)-N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide

分子式: C<sub>23</sub>H<sub>36</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

化学構造式:



分子量: 372.54

性状: 白色の結晶性の粉末である。

メタノール又はエタノール (99.5) に溶けやすく、水にほとんど溶けない。

### 【取扱い上の注意】

#### 安定性試験<sup>3)</sup>

最終包装製品を用いた加速試験（40℃，相対湿度75%，6ヵ月）の結果，フィナステリド錠0.2mg「SN」及びフィナステリド錠1mg「SN」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

### 【包 装】

フィナステリド錠0.2mg「SN」： 28錠（14錠×2）  
フィナステリド錠1mg「SN」： 28錠（14錠×2）  
140錠（14錠×10）

### 【主 要 文 献】

- 1) 社内資料（生物学的同等性試験）
- 2) 福住 仁 他：日薬理誌，127：495，2006
- 3) 社内資料（安定性試験）

### 【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

あすか製薬株式会社 くすり相談室  
〒108-8532 東京都港区芝浦二丁目5番1号  
TEL 0120-848-339  
FAX 03-5484-8358

製造販売元

**シオノケミカル株式会社**

東京都中央区八重洲2丁目10番10号

発売元

**あすか製薬株式会社**

東京都港区芝浦二丁目5番1号

販売

**武田薬品工業株式会社**

大阪府中央区道修町四丁目1番1号