

貯法：室温保存

有効期間：3年

| | | |
|------|------------------|------------------|
| | 2.5mg | 5mg |
| 承認番号 | 22900AMX00853000 | 22900AMX00854000 |
| 販売開始 | 2017年12月 | 2017年12月 |

HMG-CoA還元酵素阻害剤
日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠

ロスバスタチン錠 2.5mg「サンド」 ロスバスタチン錠 5mg「サンド」

Rosuvastatin Tablets 2.5mg・5mg [SANDOZ]

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 肝機能が低下していると考えられる以下のようないかん患者
急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸
[9.3.1、9.3.2、16.6.2 参照]
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦
[9.5、9.6 参照]
- 2.4 シクロスボリンを投与中の患者[10.1、16.7.2 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

| 販売名 | ロスバスタチン錠 2.5mg 「サンド」 | ロスバスタチン錠 5mg 「サンド」 |
|------|--|--|
| 有効成分 | 1錠中日局ロスバスタチンカルシウム 2.6mg (ロスバスタチンとして 2.5mg) | 1錠中日局ロスバスタチンカルシウム 5.2mg (ロスバスタチンとして 5.0mg) |
| 添加剤 | 無水乳糖、結晶セルロース・軽質無水ケイ酸、クロスボビドン、乾燥炭酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、乳糖水和物、マクロゴール 400、酸化チタン | |

3.2 製剤の性状

| 販売名 | ロスバスタチン錠 2.5mg 「サンド」 | ロスバスタチン錠 5mg 「サンド」 |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 剤形 | 円形のフィルムコーティング錠 | |
| 色調 | 白色 | |
| 外形 | | |
| 直径 | 5.7mm | 7.1mm |
| 厚さ | 3.3mm | 4.2mm |
| 質量 | 83mg | 163mg |
| 識別コード | RSV2.5 | RSV 5 |

4. 効能又は効果

高コレステロール血症

5. 効能又は効果に関する注意

適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。

6. 用法及び用量

通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは增量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで增量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない重症患者に限り、さらに增量できるが、1日最大20mgまでとする。

7. 用法及び用量に関する注意

7.1 クレアチニクリアランスが30mL/min/1.73m²未満の患者に投与する場合には、2.5mgより投与を開始し、1日最大投与量は5mgとする。[9.2.2、9.2.3、16.6.3 参照]

7.2 特に20mg投与時においては腎機能に影響があらわれるおそれがある。20mg投与開始後12週までの間は原則、月に1回、それ以後は定期的（半年に1回等）に腎機能検査を行うなど、観察を十分に行うこと。[9.2.2、9.2.3、16.6.3 参照]

8. 重要な基本的注意

- 8.1 あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や高血圧、喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分考慮すること。
- 8.2 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。
- 8.3 投与開始又は增量後12週までの間は原則、月に1回、それ以後は定期的（半年に1回等）に肝機能検査を行うこと。[11.1.5 参照]
- 8.4 血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行うこと。[11.1.6 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある以下の患者

- ・アルコール中毒患者
- ・甲状腺機能低下症の患者
- ・遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィー等）又はその家族歴のある患者
- ・薬剤性の筋障害の既往歴のある患者

9.1.2 重症筋無力症又はその既往歴のある患者

重症筋無力症（眼筋型、全身型）が悪化又は再発することがある。[11.1.4 参照]

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 腎機能検査値異常のある患者

本剤とフィブラーート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。[10.2 参照]

9.2.2 腎障害又はその既往歴のある患者

横紋筋融解症の報告例の多くが腎機能障害を有する患者であり、また、横紋筋融解症に伴って急激な腎機能悪化があらわれることがある。[7.1、7.2、16.6.3 参照]

9.2.3 重度の腎障害のある患者

本剤の血中濃度が高くなるおそれがある。[7.1、7.2、16.6.3 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 肝機能が低下していると考えられる以下の患者

急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝癌、黄疸投与しないこと。これらの患者では、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。また、本剤は主に肝臓に分布して作用す

るので、肝障害を悪化させるおそれがある。[2.2、16.6.2 参照]

9.3.2 肝障害又はその既往歴のある患者

本剤は主に肝臓に分布して作用するので、肝障害又はその既往歴のある患者では、肝障害を悪化させるおそれがある。特に、Child-Pugh スコアが8~9の患者では、血漿中濃度が他に比べて高かったとの報告がある。[2.2、16.6.2 参照]

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。ラットに他の HMG-CoA 還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されている。更にヒトでは、他の HMG-CoA 還元酵素阻害剤で、妊娠3カ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告がある。[2.3 参照]

9.6 授乳婦

投与しないこと。ラットで乳汁中への移行が報告されている。[2.3 参照]

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

10. 相互作用

本剤は、OATP1B1 及び BCRP の基質である。

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|--|---|---|
| シクロスボリン (サンディミュン、ネオーラル等) [2.4、16.7.2 参照] | シクロスボリンを投与されている心臓移植患者に併用したとき、シクロスボリンの血中濃度に影響はなかったが、本剤の AUC ₀₋₂₄ が健康成人に単独で反復投与したときに比べて約7倍上昇したとの報告がある。 | シクロスボリンが OATP1B1 及び BCRP 等の機能を阻害する可能性がある。 |

10.2 併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|--|---|
| フィブラー系薬剤 ペザフィブラー等 [9.2.1 参照] | フェノファイブラートとの併用においては、いずれの薬剤の血中濃度にも影響はみられていない。しかし一般に、HMG-CoA 還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。 | 両剤共に横紋筋融解症の報告がある。 危険因子：腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者 |
| ニコチン酸 | 一般に、HMG-CoA 還元酵素阻害剤との併用で、筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。 | 危険因子：腎機能障害のある患者 |
| アズール系抗真菌薬 イトラコナゾール等 | | |
| マクロライド系抗生素 エリスロマイシン等 | | |
| クマリン系抗凝固剤 ワルファリン | 抗凝血作用が増強することがある。本剤を併用する場合は、本剤の投与開始時及び用量変更時にも頻回にプロトロンビン時間国際標準比(INR) 値等を確認し、必要に応じてワルファリンの用量を調節する等、注意深く投与すること。 | 機序は不明 |
| 制酸剤 水酸化マグネシウム・ 水酸化アルミニウム [16.7.1 参照] | 本剤の血中濃度が約50%に低下することが報告されている。本剤投与後2時間経過後に制酸剤を投与した場合には、本剤の血中濃度は非併用時の約80%であった。 | |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|--|---|--|
| ロビナビル・リトナビル アタザナビル/リトナビル ダルナビル/リトナビル グレカブレビル・ビブレンタスピル | 本剤とロビナビル・リトナビルを併用したとき本剤の AUC が約2倍、C _{max} が約5倍、アタザナビル及びリトナビル両剤と本剤を併用したとき本剤の AUC が約3倍、C _{max} が7倍、ダルナビル及びリトナビル両剤と本剤を併用したとき本剤の AUC が約1.5倍、C _{max} が約2.4倍上昇したとの報告がある。また本剤とグレカブレビル・ビブレンタスピル ^{注)} を併用したとき、本剤の AUC が約2.2倍、C _{max} が約5.6倍上昇したとの報告がある。 | 左記薬剤が OATP1B1 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| ダクラタスピル アスナブレビル ダクラタスピル・アスナブレビル・ベクラブビル | 本剤とダクラタスピル、アスナブレビル、またはダクラタスピル・アスナブレビル・ベクラブビル ^{注)} を併用したとき、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。 | ダクラタスピル、ベクラブビルが OATP1B1、IB3 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。また、アスナブレビルが OATP1B1、IB3 の機能を阻害する可能性がある。 |
| グラゾブレビル/エルバスピル | 本剤とグラゾブレビル ^{注)} 及びエルバスピルを併用したとき、本剤の AUC が約2.3倍、C _{max} が約5.5倍上昇したとの報告がある。 | 左記薬剤が BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| ソホスブピル・ベルバタスピル | 本剤とベルバタスピルを併用したとき、本剤の AUC が約2.7倍、C _{max} が約2.6倍上昇したとの報告がある。 | ベルバタスピルが OATP1B1、IB3 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| ダロルタミド | 本剤とダロルタミドを併用したとき、本剤の AUC が5.2倍 ¹⁾ 、C _{max} が5.0倍上昇したとの報告がある。 | ダロルタミドが OATP1B1、IB3 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| レゴラフェニブ | 本剤とレゴラフェニブを併用したとき、本剤の AUC が3.8倍、C _{max} が4.6倍上昇したとの報告がある。 | レゴラフェニブが BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| カブマチニブ塩酸塩水和物 | 本剤とカブマチニブ塩酸塩水和物を併用したとき、本剤の AUC が約2.1倍、C _{max} が約3.0倍上昇したとの報告がある。 | カブマチニブ塩酸塩が BCRP の機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。 |
| バダデュスタッフ | 本剤とバダデュスタッフを併用したとき、本剤の AUC が約2.5倍、C _{max} が約2.7倍上昇したとの報告がある。 | バダデュスタッフが BCRP の機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。 |
| フェブキソスタッフ | 本剤とフェブキソスタッフを併用したとき、本剤の AUC が約1.9倍、C _{max} が約2.1倍上昇したとの報告がある。 | フェブキソスタッフが BCRP の機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。 |
| エルトロンボバグ | 本剤とエルトロンボバグを併用したとき、本剤の AUC が約1.6倍上昇したとの報告がある。 | エルトロンボバグが OATP1B1 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| ホスタマチニブナトリウム水和物 | 本剤とホスタマチニブナトリウム水和物を併用したとき、本剤の AUC が1.96倍、C _{max} が1.88倍上昇したとの報告がある。 | ホスタマチニブナトリウム水和物が BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| ロキサデュスタッフ | 本剤とロキサデュスタッフを併用したとき、本剤の AUC が2.93倍、C _{max} が4.47倍上昇したとの報告がある。 | ロキサデュスタッフが OATP1B1 及び BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |
| タファミジス | 本剤とタファミジスを併用したとき、本剤の AUC が1.97倍、C _{max} が1.86倍上昇したとの報告がある。 | タファミジスが BCRP の機能を阻害する可能性がある。 |

注) 承認用量外の用量における試験結果に基づく。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 横紋筋融解症（0.1%未満）

筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止すること。

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

広範な筋肉痛、高度な脱力感や著明な CK の上昇があらわれた場合には投与を中止すること。

11.1.3 免疫介在性壞死性ミオパチー（頻度不明）

近位筋脱力、CK 高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗 HMG-CoA 還元酵素（HMGCR）抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壞死性ミオパチーがあらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。

11.1.4 重症筋無力症（頻度不明）

重症筋無力症（眼筋型、全身型）が発症又は悪化することがある。[9.1.2 参照]

11.1.5 肝炎（0.1%未満）、肝機能障害（1%未満）、黄疸（頻度不明）

肝炎、AST、ALT の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。[8.3 参照]

11.1.6 血小板減少（0.1%未満）

[8.4 参照]

11.1.7 過敏症状（0.1%未満）

血管浮腫を含む過敏症状があらわれることがある。

11.1.8 間質性肺炎（0.1%未満）

長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.9 末梢神経障害（0.1%未満）

四肢の感覺鈍麻、しづれ感等の感覺障害、疼痛、あるいは筋力低下等の末梢神経障害があらわれることがある。

11.1.10 多形紅斑（頻度不明）

11.2 その他の副作用

| | 2~5%未満 | 0.1~2%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 |
|-------|----------------------|---|---------------------|-------|
| 皮膚 | | そう痒症、発疹、尋麻疹 | | 苔癭様皮疹 |
| 消化器 | | 腹痛、便秘、嘔気、下痢 | 膵炎、口内炎 | |
| 筋・骨格系 | CK 上昇 | 無力症、筋肉痛、関節痛 | 筋痙攣 | |
| 精神神経系 | | 頭痛、浮動性めまい | 健忘、睡眠障害（不眠、悪夢等）、抑うつ | |
| 内分泌 | | | 女性化乳房 | |
| 代謝異常 | | | HbA1c 上昇、血糖値上昇 | |
| 肝臓 | 肝機能異常（AST 上昇、ALT 上昇） | | | |
| 腎臓 | | 蛋白尿 ^{注)} 、腎機能異常（BUN 上昇、血清クレアチニン上昇） | | |

注) 通常一過性であるが、原因不明の蛋白尿が持続する場合には減量するなど適切な処置を行うこと。

発現頻度は使用成績調査から算出した。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道

粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縫隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

海外において、本剤を含む HMG-CoA 還元酵素阻害剤投与中の患者では、糖尿病発症のリスクが高かったとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人男性 6 例にロスバスタチンカルシウムを 5mg の用量で空腹時に単回経口投与したところ、血漿中ロスバスタチン濃度は投与後 5 時間に C_{max} を示し、消失半減期 (T_{1/2}) は 20.2±7.8 時間であった。また、C_{max} 及び AUC_{0-24h} はそれぞれ 3.56±1.35ng/mL 及び 31.3±13.6ng·hr/mL であった²⁾ (平均値±標準偏差)。なお、ロスバスタチンの体内動態は線形であると考えられている³⁾ (外国人データ)。

16.1.2 反復投与

健康成人男性 6 例にロスバスタチンカルシウム 10 及び 20mg を 1 日 1 回 7 日間、空腹時に反復経口投与したところ、投与後 24 時間の血漿中ロスバスタチン濃度は徐々に上昇し、反復投与 3 回目にはほぼ定常状態に到達した⁴⁾。定常状態における AUC_{0-24h} は単回投与時の 1.2 倍であり、その値は単回投与での結果からの予測値と同程度であった。したがって、反復投与による予想以上の蓄積性はないと考えられた。なお、日本人における C_{max} 及び AUC は外国人の約 2 倍であった⁵⁾。

健康成人男性におけるロスバスタチンの薬物動態パラメータ (n=6)

| 用量 (mg) | C _{max} ^{a)} (ng/mL) | T _{max} ^{b)} (hr) | AUC _{0-24h} ^{a)} (ng · hr/mL) | AUC _{0-∞} ^{a)} (ng · hr/mL) | T _{1/2} ^{c)} (hr) |
|------------|---|--|--|--|--|
| 10 | 単回 | 7.87 (54.4) | 5 (4-5) | 74.2 (56.0) | 126 (39.3) ^{d)} |
| | 反復 | 9.38 (71.5) | 5 (5-5) | 90.5 (67.0) | 167 (30.0) ^{e)} |
| 20 | 単回 | 20.5 (54.6) | 4 (3-5) | 171 (53.0) | 209 (50.1) |
| | 反復 | 22.1 (68.0) | 5 (5-5) | 206 (63.9) | 248 (62.2) |

a) 幾何平均値 (変動係数)、b) 中央値 (範囲)、c) 平均値±標準偏差、d) n=3、e) n=4

高コレステロール血症患者にロスバスタチンカルシウム 2.5~20mg を 1 日 1 回 6 週間反復経口投与し、定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度を測定した⁶⁾。高コレステロール血症患者の血漿中ロスバスタチン濃度は用量にはほぼ比例して増加し、健康成人男性での値 (投与後 10 時間の幾何平均値、10mg : 4.06ng/mL、20mg : 9.82ng/mL) とほぼ同程度であった。なお、本試験で日本人と外国人の結果を比較したところ、日本人における定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度は外国人の約 2 倍であった⁷⁾。

高コレステロール血症患者における定常状態の血漿中ロスバスタチン濃度

| 投与量 | 血漿中ロスバスタチン濃度 (ng/mL) |
|--------------|----------------------|
| 2.5mg (n=16) | 1.26 (72.7) |
| 5mg (n=12) | 2.62 (41.5) |
| 10mg (n=13) | 4.17 (75.5) |
| 20mg (n=17) | 11.7 (50.0) |

幾何平均値 (変動係数) 採血時間：投与後 7~16 時間

16.1.3 投与時間の影響

外国人健康成人 21 例にロスバスタチンカルシウム 10mg をクロスオーバー法で 1 日 1 回 14 日間、午前 7 時あるいは午後 6 時に経口投与したところ、血漿中ロスバスタチン濃度推移は両投与時間で同様であり、ロスバスタチンカルシウムの体内動態は投与時間の影響を受けないと考えられた⁸⁾。


16.1.4 生物学的同等性試験

ロスバスタチン錠 5mg「サンド」

ロスバスタチン錠 5mg「サンド」とクレストール錠 5mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (ロスバスタチンとして 5mg) 健康成人男性に絶食下単回経口投与して血漿中ロスバスタチン濃度を測定した。得られたロスバスタチンの薬物動態パラメータ

(AUC、C_{max})について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された⁹⁾。

ロスバスタチン錠5mg「サンド」投与後の血漿中濃度推移



なお、血漿中濃度並びにAUC、C_{max}等の薬物動態パラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 生物学的利用率

健康成人男性10例におけるロスバスタチンの生物学的利用率は29.0%（90%信頼区間：24.1～34.9）であった¹⁰⁾。また、静脈内投与して得られたロスバスタチンの全身クリアランス及び腎クリアランスはそれぞれ31.9及び11.6L/hrであり、ロスバスタチンは主に肝臓による消失を受けると考えられた。

16.2.2 食事の影響

外国人健康成人20例にロスバスタチンカルシウム10mgをクロスオーバー法で1日1回14日間、空腹時（食後3時間）あるいは食後に経口投与した¹¹⁾。食後投与したときのロスバスタチンカルシウムの吸収は空腹時に比べて緩やかであり、C_{max}は食事によって20%低下した。しかし、食後投与時のAUC_{0-24h}は空腹時投与の94%であり、ロスバスタチンカルシウムの吸収量への食事の影響はないと考えられた。

16.3 分布

ヒト血漿中におけるロスバスタチンの蛋白結合率は89.0%（日本人）～88.0%（外国人）であり、主結合蛋白はアルブミンであった¹²⁾。

16.4 代謝

外国人健康成人男性6例に¹⁴C-ロスバスタチンカルシウム20mgを単回経口投与したところ、尿及び糞中に存在する放射能の主成分は未変化体であり、尿糞中の主な代謝物は、N-脱メチル体及び5S-ラクトン体であった¹³⁾。

ヒト血漿中にはN-脱メチル体及び5S-ラクトン体が検出されたが、HMG-CoA還元酵素阻害活性体濃度はロスバスタチン濃度と同様の推移を示し、血漿中におけるHMG-CoA還元酵素阻害活性に対する代謝物の寄与はわずかであると考えられた¹⁴⁾（外国人データ）。

16.5 排泄

外国人健康成人男性6例に¹⁴C-ロスバスタチンカルシウム20mgを単回経口投与したところ、放射能は主に糞中に排泄され（90.2%）、尿中放射能排泄率は10.4%であった。また、尿及び糞への未変化体排泄率は、それぞれ投与量の4.9%及び76.8%であった¹³⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 性差及び加齢の影響

外国人の男性若年者、男性高齢者、女性若年者及び女性高齢者各8例にロスバスタチンカルシウム40mg（承認外用量）を単回経口投与したところ、男性のC_{max}及びAUC_{0-t}はそれぞれ女性の82%及び91%であった¹⁵⁾。また、若年者のC_{max}及びAUC_{0-t}はそれぞれ

高齢者の112%及び106%であり、臨床上問題となる性差や加齢の影響はないと考えられた。

16.6.2 肝障害の影響

Child-Pugh A（スコア：5～6）あるいはChild-Pugh B（スコア：7～9）の肝障害を有する外国人患者各6例にロスバスタチンカルシウム10mgを1日1回14日間反復経口投与し、血漿中ロスバスタチン濃度を測定した¹⁶⁾。肝障害患者のC_{max}及びAUC_{0-24h}は健康成人群のそれぞれ1.5～2.1倍及び1.05～1.2倍であり、特に、Child-Pughスコアが8～9の患者2例における血漿中濃度は、他に比べて高かった。[2.2、9.3 参照]

16.6.3 腎障害の影響

重症度の異なる腎障害を有する外国人患者（4～8例）にロスバスタチンカルシウム20mgを1日1回14日間反復経口投与し、血漿中ロスバスタチン濃度を測定した¹⁷⁾。軽度から中等度の腎障害のある患者では、ロスバスタチンの血漿中濃度に対する影響はほとんど認められなかった。しかし、重度（クレアチニクリアランス<30mL/min/1.73m²）の腎障害のある患者では、健康成人に比べて血漿中濃度が約3倍に上昇した。[7.1、9.2 参照]

16.7 薬物相互作用

16.7.1 制酸剤

制酸剤を同時併用投与した場合、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-24h}はそれぞれ50%及び46%まで低下したが、ロスバスタチン投与後2時間に制酸剤を投与した場合には、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-24h}はそれぞれ非併用時の84%及び78%であった¹⁸⁾（外国人データ）。[10.2 参照]

16.7.2 シクロスボリン

シクロスボリンを投与されている心臓移植患者にロスバスタチンを併用投与したとき、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-24h}は、健康成人に単独で反復投与したときに比べてそれぞれ10.6倍及び7.1倍上昇した¹⁹⁾（外国人データ）。ロスバスタチンはOATP1B1を介して肝臓に取り込まれ、シクロスボリンはその取り込みを阻害することによって、ロスバスタチンの血漿中濃度を増加させると考えられている。[2.4、10.1 参照]

16.7.3 ゲムフィプロジル

ゲムフィプロジル（本邦未承認）と併用投与したとき、ロスバスタチンのC_{max}及びAUC_{0-t}はそれぞれ2.21倍及び1.88倍に増加した²⁰⁾（外国人データ）。ロスバスタチンはOATP1B1を介して肝臓に取り込まれ、ゲムフィプロジルはその取り込みを阻害することによって、ロスバスタチンの血漿中濃度を増加させると考えられている。

16.7.4 その他の薬剤

ロスバスタチンの体内動態に及ぼすP450阻害剤の影響を検討するために、フルコナゾール²¹⁾（CYP2C9及びCYP2C19の阻害剤）、ケトコナゾール²²⁾、イトラコナゾール²³⁾及びエリスロマイシン²⁴⁾（以上CYP3A4及びP糖蛋白の阻害剤）との併用試験を実施したが、明らかな相互作用は認められなかった（外国人データ）。ワルファリン²⁵⁾（CYP2C9及びCYP3A4の基質）あるいはジゴキシン²⁶⁾の体内動態に及ぼす影響を検討したが、薬物動態学的相互作用は認められなかった（外国人データ）。CYP3A4誘導作用の有無を検討するために、経口避妊薬との併用試験を実施したが、エチニルエストラジオールの血漿中濃度に減少はみられず、ロスバスタチンはCYP3A4に対する誘導作用を示さないと考えられた²⁷⁾（外国人データ）。

16.7.5 in vitro 試験

ヒト離離肝細胞を用いるin vitro試験においてN-脱メチル体が生成したが、その代謝速度は非常に緩徐であった。また、N-脱メチル化に関与する主なP450分子種はCYP2C9及びCYP2C19であったが、CYP2D6やCYP3A4が関与する可能性も示唆された^{28)、29)}。

ロスバスタチン（50μg/mL）によるP450（CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1及びCYP3A4）活性の阻害率は10%以下であった²⁸⁾。

16.8 その他

ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」

ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」は「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成24年2月29日薬食審査発0229第10号）」に基づき、ロスバスタチン錠5mg「サンド」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた³⁰⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 海外第Ⅲ相用量反応試験

高コレステロール血症患者を対象として二重盲検法により実施された試験において、ロスバスタチンカルシウム（5～80mg）又はアトルバスタチン（10～80mg）を1日1回6週間投与した結果、ロスバスタチンカルシウムは、LDL-コレステロール、総コレステロール、トリグリセリドには低下効果を、HDL-コレステロールには増加効果を示した。また、アポ蛋白B、非HDL-コレステロールを低下させ、アポ蛋白A-Iを増加させた。更に、LDL-コレステロール/HDL-コレステロール比、総コレステロール/HDL-コレステロール比、非HDL-コレステロール/HDL-コレステロール比、アポ蛋白B/アポ蛋白A-I比を低下させた。

ロスバスタチンカルシウムの薬効は、投与後1週間以内にあらわれ、通常2週間までに最大効果の90%となった。最大効果は通常4週間までにあらわれ、その後持続した。

副作用発現頻度は、ロスバスタチンカルシウム5mg投与群で10.5%（4/38例）、10mg投与群では15.6%（7/45例）、及び20mg投与群で17.9%（7/39例）であった。いずれの投与群でも、3例以上発現した副作用はなかった^{31),32)}。

17.1.2 国内第Ⅱ相試験

二重盲検法により実施された試験において、ロスバスタチンカルシウム2.5～20mgを1日1回6週間投与した際の血清脂質値の平均変化率は表1のとおりであった。

表1 血清脂質値の平均変化率（高コレステロール血症患者対象試験）

| 投与量 | 2.5mg (n=17) | 5mg (n=12) | 10mg (n=14) | 20mg (n=18) |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| LDL-コレステロール (%) | -44.99 | -52.49 | -49.60 | -58.32 |
| 総コレステロール (%) | -31.59 | -36.40 | -34.60 | -39.58 |
| トリグリセリド (%) | -17.35 | -23.58 | -19.59 | -17.01 |
| HDL-コレステロール (%) | 7.64 | 9.09 | 14.04 | 11.25 |
| アポ蛋白B (%) | -38.56 | -45.93 | -43.97 | -50.38 |
| アポ蛋白A-I (%) | 5.42 | 6.25 | 10.61 | 9.72 |
| アポ蛋白A-II (%) | 0.38 | 4.27 | 7.78 | 7.73 |

副作用発現頻度は、ロスバスタチンカルシウム2.5mg投与群で38.9%（7/18例）、5mg投与群で20.0%（3/15例）、10mg投与群で13.3%（2/15例）、及び20mg投与群で47.4%（9/19例）であった。計67例において3例以上認められた副作用は、腹痛、CK上昇及びγ-GTP上昇（各3例）であった³³⁾。

17.1.3 海外第Ⅲ相試験

二重盲検法により実施された3試験の集積データをまとめた。ロスバスタチンカルシウム5mg又は10mgを1日1回12週間投与した際の血清脂質の平均変化率は表2のとおりであり、高コレステロール血症患者の脂質レベルを総合的に改善することが認められた³⁴⁾。

表2 血清脂質値の平均変化率（外国人高コレステロール血症患者対象試験）

| 投与量 | 5mg (n=390) | 10mg (n=389) |
|------------------|-------------|--------------|
| LDL-コレステロール (%) | -41.9 | -46.7 |
| 総コレステロール (%) | -29.6 | -33.0 |
| トリグリセリド (%) | -16.4 | -19.2 |
| HDL-コレステロール (%) | 8.2 | 8.9 |
| 非HDL-コレステロール (%) | -38.2 | -42.6 |
| アポ蛋白B (%) | -32.7 | -36.5 |
| アポ蛋白A-I (%) | 6.0 | 7.3 |

17.1.4 海外第Ⅲ相長期投与試験

高コレステロール血症患者を対象として二重盲検法により実施された試験において、ロスバスタチンカルシウム5mg又は10mgから投与を開始し、LDL-コレステロール値がNCEP IIガイドライン

の目標値に達するまで增量した。52週時において初回投与量の5mg又は10mgの継続投与を受けていた症例の割合は、それぞれ76%（92/121例）及び82%（88/107例）であった。

副作用の発現率はロスバスタチンカルシウム5mg群で29.4%（40/136例）、ロスバスタチンカルシウム10mg群で26.5%（35/132例）であった。いずれかの投与群で3例以上発現した副作用は下痢、消化不良、鼓腸、筋痛、不眠症、発疹、腹痛及び無力症であった^{35),36)}。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ロスバスタチンカルシウムは、肝臓内に能動的に取り込まれ、肝臓でのコレステロール生合成系の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素を選択的かつ競合的に阻害し、コレステロール生合成を強力に抑制する。その結果、肝臓内のコレステロール含量が低下し、これを補うためLDL受容体の発現が誘導される。このLDL受容体を介して、コレステロール含有率の高いリボ蛋白であるLDLの肝臓への取り込みが増加し、血中コレステロールが低下する。ロスバスタチンカルシウムは、肝臓では主として能動輸送系を介して取り込まれ、脂質親和性が比較的低いため、能動輸送系を持たない他の臓器には取り込まれにくく、肝特異的なHMG-CoA還元酵素阻害剤であると考えられる^{37),38)}。

18.1.1 HMG-CoA還元酵素阻害作用

ロスバスタチンカルシウムは、ラット及びヒト肝ミクロソーム由来のHMG-CoA還元酵素及びヒトHMG-CoA還元酵素の触媒ドメインに対して阻害作用を示した^{39) (in vitro)}。

18.1.2 肝コレステロール合成阻害作用

ロスバスタチンカルシウムは、ラット肝細胞のコレステロール合成を用量依存的に阻害した。また、その阻害作用は、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤に比べて長期間持続した³⁹⁾。

18.1.3 LDL受容体誘導作用

ロスバスタチンカルシウムは、ヒト肝癌由来HepG2細胞のLDL受容体mRNAの発現を濃度依存的に誘導し、また、LDL結合活性を増加させた^{40) (in vitro)}。

18.2 血中コレステロール低下作用

ロスバスタチンカルシウムは、イヌ⁴¹⁾、カニクイザル⁴²⁾、WHHLウサギ（ヒト家族性高コレステロール血症のモデル動物）⁴³⁾において血清総コレステロールを、また、アポ蛋白E*3Leidenトランスジェニックマウス（高VLDL血症モデル動物）⁴⁴⁾及びヒトアポ蛋白B/CETP（コレステロールエスチル転送蛋白）トランスジェニックマウス（ヒトのコレステロール代謝に類似した脂質代謝環境を有するモデル動物）⁴⁵⁾においては血漿中コレステロールを有意に低下させた。イヌにおいては、HMG-CoA還元酵素の反応産物であるメバロン酸の血中濃度を用量依存的に低下させた⁴¹⁾。

18.3 動脈硬化進展抑制作用

ロスバスタチンカルシウムは、WHHLウサギにおいて、大動脈の脂質沈着面積、コレステロール含量の低下をもたらし、動脈硬化病変の進展を抑制した⁴³⁾。

18.4 トリグリセリド低下作用

ロスバスタチンカルシウムは、アポ蛋白E*3Leidenトランスジェニックマウス及びヒトアポ蛋白B/CETPトランスジェニックマウスの血漿中トリグリセリドを低下させた^{44),45)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称

ロスバスタチンカルシウム（Rosuvastatin Calcium）

化学名

Monocalcium bis[(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate]

分子式

(C₂₂H₂₇FN₃O₆S)₂Ca

分子量

1001.14


性状

白色の粉末である。

アセトニトリルに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール（99.5）に溶けにくい。

吸湿性である。

化学構造式



20. 取扱い上の注意

開封後は湿気を避けて保存すること。

22. 包装

〈ロスバスタチン錠 2.5mg 「サンド」〉

100錠 [10錠(PTP)×10]
500錠 [10錠(PTP)×50]
500錠 [ボトル、バラ、乾燥剤入り]

〈ロスバスタチン錠 5mg 「サンド」〉

100錠 [10錠(PTP)×10]
500錠 [10錠(PTP)×50]
500錠 [ボトル、バラ、乾燥剤入り]

23. 主要文献

- 1) Zurth C, et al. : Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2019 ; 44 (6) : 747-759
- 2) 単回投与後の血漿中濃度, 1996 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.3.1.2)
- 3) Martin PD, et al. : Clin Ther. 2003 ; 25 (8) : 2215-2224
- 4) 反復投与後の血漿中濃度, 2001 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.4)
- 5) 反復投与後の血漿中濃度 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要イ 3.2.2.2)
- 6) 患者における血漿中濃度, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.6)
- 7) 患者における反復投与時の血漿中濃度 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.8)
- 8) Martin PD, et al. : Br J Clin Pharmacol. 2002 ; 54 (5) : 472-477
- 9) 社内資料: 生物学的同等性試験 (ロスバスタチン錠 5mg 「サンド」)
- 10) 生物学的利用率, 2001 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.5)
- 11) 食事の影響, 2000 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.5)
- 12) 蛋白結合率, 2000 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 2.2.5)
- 13) 尿糞中排泄率, 1999 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.9.5)
- 14) HMG-CoA還元酵素阻害活性体の血漿中濃度, 2000 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.9.4)
- 15) Martin PD, et al. : J Clin Pharmacol. 2002 ; 42 (10) : 1116-1121
- 16) Simonson SG, et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2003 ; 58 (10) : 669-675
- 17) 腎障害の影響, 2001 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.11)
- 18) 薬物相互作用 - 制酸剤, 2000 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.12.2 (f))
- 19) Simonson SG, et al. : Clin Pharmacol Ther. 2004 ; 76 (2) : 167-177
- 20) Schneck DW, et al. : Clin Pharmacol Ther. 2004 ; 75 (5) : 455-463
- 21) Cooper KJ, et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2002 ; 58 (8) : 527-531
- 22) Cooper KJ, et al. : Br J Clin Pharmacol. 2003 ; 55 (1) : 94-99
- 23) Cooper KJ, et al. : Clin Pharmacol Ther. 2003 ; 73 (4) : 322-329
- 24) Cooper KJ, et al. : Eur J Clin Pharmacol. 2003 ; 59 (1) : 51-56
- 25) Simonson SG, et al. : J Clin Pharmacol. 2005 ; 45 (8) : 927-934
- 26) Martin PD, et al. : J Clin Pharmacol. 2002 ; 42 (12) : 1352-1357
- 27) Simonson SG, et al. : Br J Clin Pharmacol. 2004 ; 57 (3) : 279-286

- 28) McCormick AD, et al. : J Clin Pharmacol. 2000 ; 40 : 1055
- 29) ロスバスタチンの *in vitro* 代謝 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要へ 3.7.9)
- 30) 社内資料: 生物学的同等性試験及び溶出試験 (ロスバスタチン錠 2.5mg 「サンド」)
- 31) Schneck DW, et al. : Am J Cardiol. 2003 ; 91 (1) : 33-41
- 32) アトルバスタチンとの用量反応比較試験 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ト 1.3.2)
- 33) 日本人高コレステロール血症患者における有効性, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ト 1.2.3)
- 34) 外国人高コレステロール血症患者における有効性, 2001 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ト 2.1.2.1)
- 35) 外国人高コレステロール血症患者の長期投与における有効性, 2001 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ト 1.5.2)
- 36) Olsson AG, et al. : Am Heart J. 2002 ; 144 (6) : 1044-1051
- 37) Nezasa K, et al. : Xenobiotica. 2003 ; 33 (4) : 379-388
- 38) 作用機序のまとめ (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.2.8)
- 39) McTaggart F, et al. : Am J Cardiol. 2001 ; 87 (5A) : 28B-32B
- 40) LDL受容体に対する作用, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.2.3)
- 41) イヌの血中脂質に対する作用, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.1)
- 42) カニケイザルの血清コレステロール及びリポ蛋白コレステロールに対する作用, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.2)
- 43) WHHL ウサギの血清コレステロール及び動脈硬化病変に対する作用, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.3)
- 44) アポ蛋白 E*3Leiden トランスジェニックマウスに対する作用, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.4)
- 45) ヒトアポ蛋白 B/CETP トランスジェニックマウスに対する作用, 2002 (クレストール錠: 2005年1月19日承認、申請資料概要ホ 1.1.5)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ
〒105-6333 東京都港区虎ノ門1-23-1
TEL 0120-982-001
FAX 03-6257-3633

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売

サンド株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1
URL:<https://www.sandoz.jp/>