

※※2017年12月改訂（ 部分：第7版、販売名の変更）
 ※2013年10月改訂（ 部分：第6版）

Ca拮抗剤

劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

日本薬局方
 ニルバジピン錠

※※ **ニルバジピン錠2mg「トーフ」**

※※ **ニルバジピン錠4mg「トーフ」**

NILVADIPINE TABLETS 2mg “TOWA” / TABLETS 4mg “TOWA”







貯 法：室温保存
 使用期限：外箱に記載

日本標準商品分類番号 872149			
	承認番号	薬価収載	販売開始
※※	錠 2 mg	22900AMX00555	2017年12月
※※	錠 4 mg	22900AMX00556	2017年12月
			2003年 7月
			2005年 7月

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- 1) 頭蓋内出血で止血が完成していないと推定される患者
 [出血を助長するおそれがある。]
- 2) 脳卒中急性期で頭蓋内圧が亢進している患者 [頭蓋内圧の亢進を増悪するおそれがある。]
- 3) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
- 4) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

※※ **【組成・性状】**

		ニルバジピン錠 2 mg 「トーフ」	ニルバジピン錠 4 mg 「トーフ」
1錠中の有効成分		日局 ニルバジピン …………… 2 mg	日局 ニルバジピン …………… 4 mg
添加物		乳糖水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄	
性状		帯褐黄色のフィルムコーティング錠	
識別コード	本体	Tw245	Tw235
	包装		
外形	表		
	裏		
	側面		
錠径 (mm)		6.1	8.2
厚さ (mm)		3.1	3.9
質量 (mg)		95	188

【効能・効果】

本態性高血圧症

【用法・用量】

ニルバジピンとして、通常、成人には1回2～4mgを1日2回経口投与する。

※ **【使用上の注意】**

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - 1) 肝機能障害のある患者 [本剤は主に肝臓で代謝されることから、血中濃度が高くなる可能性がある。]
 - 2) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
2. 重要な基本的注意
 - 1) カルシウム拮抗剤の投与を急に中止したとき、症状が悪化した症例が報告されているので、本剤の休薬を要する場合は徐々に減量し、観察を十分に行うこと。また、患者に医師の指示なしに服薬を中止しないように注意すること。
 - 2) 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
3. 相互作用

本剤は主として肝薬物代謝酵素CYP3A4で代謝される。

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
降圧剤	降圧作用が増強するおそれがある。	相加的に降圧作用を増強させる。
シメチジン	本剤の作用が増強するおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない。	シメチジンが薬物代謝酵素CYP3A4を阻害するため、本剤の血中濃度を上昇させる。
リトナビル サキナビル イトラコナゾール グレープフルーツジュース		相手薬が薬物代謝酵素CYP3A4を阻害するため、本剤の血中濃度を上昇させるおそれがある。
タクロリムス シクロスポリン	相手薬及び本剤の作用が増強するおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない。相手薬の血中濃度に注意すること。	本剤及び相手薬が薬物代謝酵素CYP3A4で代謝されるため相互に代謝が阻害され、相手薬及び本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。
リファンピシン	本剤の作用が減弱するおそれがある。ただし、本剤に関する症例報告はない。	リファンピシンが薬物代謝酵素CYP3A4を誘導するため、本剤の血中濃度を低下させる。

注1) 注意－医師等の処方箋により使用すること

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

1) 重大な副作用（頻度不明）

肝機能障害：AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTP上昇等の肝機能障害があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) その他の副作用

	頻度不明
肝臓 ^{注2)}	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇
循環器	動悸、頻脈、房室ブロック ^{注3)} 、心房細動、期外収縮、徐脈、血圧低下
精神神経系	頭痛、頭重、めまい、ふらつき、立ちくらみ、眠気、不眠、しびれ、振戦
消化器	食欲不振、腹痛、腹部不快感、悪心、嘔吐、便秘、下痢、口内炎、口渇、胸やけ
腎臓	クレアチニン上昇、BUN上昇
過敏症 ^{注3)}	発疹、そう痒感、光線過敏症
口腔 ^{注4)}	歯肉肥厚
※ その他	潮紅、熱感、ほてり、のぼせ、浮腫、けん怠感、胸痛、胸部不快感、頻尿、耳鳴、血清コレステロール上昇、咳嗽、結膜充血

注2) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。
注3) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注4) 連用により、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

一般的に高齢者では、過度の降圧は好ましくないとされていることから、高齢者に使用する場合は、低用量から投与を開始し、経過を十分に観察しながら慎重に投与することが望ましい。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与を避けること。〔動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが報告されている。〕
- 授乳婦：授乳中の女性への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。〔動物実験で母乳中へ移行することが報告されている。〕

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。(使用経験がない)

8. 適用上の注意


薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

※※【薬物動態】

※※ 1. 生物学的同等性試験

1) ニルバジピン錠 2 mg 「トーワ」

ニルバジピン錠 2 mg 「トーワ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（ニルバジピンとして 2 mg）健康成人男子（n=39）に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、AUCがガイドラインの基準を満たすとともに治療効果と関連する定常状態における平均血漿中濃度が同じ値を示し、さらにMRT（平均血中滞留時間）、Kel（消失速度定数）及び消失過程の濃度推移に問題となる差がないことから、両剤は治療上同等の効果を期待できると判断した¹⁾。



	判定パラメータ		参考パラメータ			
	AUC ₃₂ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)	MRT ₃₂ [*] (hr)	Kel ^{**} (hr ⁻¹)
ニルバジピン錠 2 mg 「トーワ」 (錠剤, 2 mg)	6.858 ± 2.637	2.4076 ± 0.9786	0.933 ± 0.325	10.014 ± 2.786	4.6793 ± 0.5409	0.07905 ± 0.04648
標準製剤 (錠剤, 2 mg)	6.857 ± 3.685	2.0924 ± 1.2036	1.214 ± 0.604	10.433 ± 3.136	4.9412 ± 0.6770	0.07457 ± 0.03603

(Mean ± S. D., n=39)

* : 平均血中滞留時間

** : 消失速度定数

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2) ニルバジピン錠 4 mg 「トーワ」

ニルバジピン錠 4 mg 「トーワ」は、「含量が異なる経口固形剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成12年2月14日 医薬審第64号）」に基づき、ニルバジピン錠 2 mg 「トーワ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた²⁾。

※※ 2. 溶出挙動

ニルバジピン錠 2 mg 「トーワ」及びニルバジピン錠 4 mg 「トーワ」は、日本薬局方医薬品各条に定められたニルバジピンの溶出規格にそれぞれ適合していることが確認されている³⁾⁴⁾。

3. 代謝


本剤の主な代謝経路は肝薬物代謝酵素CYP3A4によるジヒドロピリジン環の酸化、さらにそれに続くエステル基の加水分解及びメチル基の水酸化である。

【薬効薬理】

膜電位依存性L型カルシウムチャンネルに特異的に結合し、細胞内へのカルシウムの流入を減少させることにより、冠血管や末梢血管の平滑筋を弛緩させる。非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬（ベラパミルやジルチアゼム）と比較すると、血管選択性が高く、心収縮力や心拍数に対する抑制作用は弱い⁵⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

構造式：



一般名：ニルバジピン (Nilvadipine)

化学名：3-Methyl 5-(1-methylethyl) (4*RS*)-2-cyano-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

分子式：C₁₉H₁₉N₃O₆

分子量：385.37

性状：黄色の結晶性の粉末である。アセトニトリルに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、エタノール (99.5) にやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。アセトニトリル溶液 (1→20) は旋光性を示さない。

融点：167～171℃

【取扱い上の注意】

安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験 (40℃、相対湿度75%、6ヵ月) の結果、通常の市場流通下においてそれぞれ3年間安定であることが推測された⁶⁾⁷⁾。

※※【包装】

※※ニルバジピン錠 2 mg 「トーワ」：100錠、1000錠 (PTP)

※※ニルバジピン錠 4 mg 「トーワ」：100錠、1000錠 (PTP)

【主要文献】

- 1) 東和薬品株式会社 社内資料：生物学的同等性試験 (錠 2 mg)
- 2) 東和薬品株式会社 社内資料：生物学的同等性試験 (錠 4 mg)
- 3) 東和薬品株式会社 社内資料：溶出試験 (錠 2 mg)
- 4) 東和薬品株式会社 社内資料：溶出試験 (錠 4 mg)
- 5) 第十六改正日本薬局方解説書、C-3387, 2011
- 6) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験 (錠 2 mg)
- 7) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験 (錠 4 mg)

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献 (社内資料を含む) は下記にご請求下さい。

東和薬品株式会社 学術部DIセンター (24時間受付対応)

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

☎0120-108-932 TEL 06-6900-9108 FAX 06-6908-5797

<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>



製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号