

\*2024年8月改訂（第2版）  
2023年12月改訂（第1版）

外用殺菌消毒剤

日本標準商品分類番号

872612

ポビドンヨード液

# ポビドンヨード消毒液 10%

「カネイチ」

POVIDONE-IODINE DISINFECTANT  
SOLUTION 10% 「KANEICHI」

貯法：室温保存

\*有効期間：15mL 容器：4年

15mL 容器以外：3年

承認番号 30200AMX00741000

販売開始 2021年1月

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

有効成分	1mL 中 ポビドンヨード 100mg (有効ヨウ素として10mg)
添加剤	ラウロマクロゴール、ポリオキシエチレンノ ニルフェニルエーテル、pH 調節剤

### 3.2 製剤の性状

性状	赤褐色粘稠性の液でわずかに特異なおいがある。
----	------------------------

## 4. 効能又は効果

- 手術部位（手術野）の皮膚の消毒。
- 手術部位（手術野）の粘膜の消毒。
- 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒。
- 熱傷皮膚面の消毒。
- 感染皮膚面の消毒。

## 6. 用法及び用量

〈手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の  
粘膜の消毒〉

本剤を塗布する。

〈皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮  
膚面の消毒〉

本剤を患部に塗布する。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1.1 甲状腺機能に異常のある患者

血中ヨウ素の調節ができず甲状腺ホルモン関連物質に影響を与えるおそれがある。

#### 9.1.2 重症の熱傷患者

ヨウ素の吸収により、血中ヨウ素値が上昇することがある。

### 9.5 妊婦

妊婦または妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

長期にわたる広範囲の使用を避けること<sup>1)</sup>。

本剤を妊婦の腔内に長期間使用し、新生児に一過性の甲状腺機能低下があらわれたとの報告がある<sup>2)</sup>。

### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

長期にわたる広範囲の使用を避けること<sup>1)</sup>。

ポビドンヨード製剤を腔内に使用し、乳汁中の総ヨウ素値が一過性に上昇したとの報告がある<sup>3)</sup>。

### 9.7 小児等

本剤を新生児に使用し、一過性の甲状腺機能低下を起こし

たとの報告がある<sup>4)</sup>。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 ショック（0.1%未満）、アナフィラキシー（0.1%未満）

呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、蕁麻疹等があらわれることがある。

#### 11.2 その他の副作用

	0.1%未満
過敏症	発疹
皮膚	接触皮膚炎、そう痒感、灼熱感、皮膚潰瘍、皮膚変色
甲状腺	血中甲状腺ホルモン値（T <sub>3</sub> 、T <sub>4</sub> 値等）の上昇あるいは低下などの甲状腺機能異常

## 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

酸化反応を利用した潜血試験において、本剤が検体に混入すると偽陽性を示すことがある<sup>5)</sup>。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤使用時の注意

14.1.1 本剤は外用消毒剤であるので、経口投与、吸入、注射、眼及び体腔内（腹腔内、胸腔内等）に使用しないこと。

14.1.2 大量かつ長時間の接触によって接触皮膚炎、皮膚変色があらわれることがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと<sup>6)</sup>。本剤が手術時に体の下にたまった状態や、ガーゼ・シーツ等にしみ込み湿った状態で、長時間皮膚と接触しないよう消毒後は拭き取るか乾燥させるなど注意すること。

14.1.3 眼に入らないように注意すること。入った場合には、水でよく洗い流すこと。

14.1.4 深い創傷に使用する場合は希釈液としては生理食塩液か注射用水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

14.1.5 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。

14.1.6 電気的な絶縁性をもっているため、電気メスを使用する場合には、本剤が対極板と皮膚の間に入らないよう注意すること。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

ポビドンヨード製剤を腔内に使用し、血中総ヨウ素値及び血中無機ヨウ素値が一過性に上昇したとの報告がある<sup>7)</sup>。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 17.1.1 臨床試験

臨床効果の有効率は1,142例中1,101例96.4%を示し、その内容は手術部位（手術野）では966例中935例96.8%、創傷部位・熱傷皮膚面では64例中63例98.4%、感染皮膚面では112例中103例92.0%であった。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

水溶液中のポビドンヨード液はヨウ素を遊離し、その遊離ヨウ素（I<sub>2</sub>）が水を酸化してH<sub>2</sub>OI<sup>+</sup>が生じる。H<sub>2</sub>OI<sup>+</sup>は細菌及びウイルス表面の膜タンパク（-SH グループ、チロシン、ヒスチジン）と反応することにより、細菌及びウイルスを死滅させると推定される。

### 18.2 細菌等に対する効果（*in vitro*）

18.2.1 本剤の各種細菌に対する最小発育阻止濃度（MIC）値は次のとおりであった<sup>8)</sup>。

供試菌	MIC (µg/mL) <sup>注)</sup>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> IF0 13275	10000
<i>Proteus vulgaris</i> IF0 3988	5000
<i>Escherichia coli</i> IF0 3806	11000
<i>Staphylococcus aureus</i> IF0 12732	7500

注) MICは、ポビドンヨードとしての濃度を示す。

18.2.2 10%ポビドンヨード液の臨床分離株に対する効果は次のとおりであった<sup>9)~12)</sup>。

被験菌	株数	10%ポビドンヨード液の希釈倍率 (PVP-I 濃度)	作用時間	滅菌率
<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Escherichia coli</i>	10	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Serratia marcescens</i>	20	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Burkholderia cepacia</i>	10	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	10	20倍 (0.5%)	30秒	99.99%以上
<i>Mycobacterium avium</i>	2	100倍 (0.1%)	30秒	99.9%以上
<i>Mycobacterium kansasii</i>	3	100倍 (0.1%)	30秒	99.9%以上
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	7	100倍 (0.1%)	30秒	99.99%以上
<i>Bordetella pertussis</i>	10	50倍 (0.2%)	15秒	99.99%以上

### 18.3 ウイルスに対する効果（*in vitro*）

10%ポビドンヨード液のウイルスに対する効果は次のとおりであった<sup>13)~18)</sup>。

ウイルス	10%ポビドンヨード液の希釈倍率 (PVP-I 濃度)	作用時間	ウイルス不活化率
単純ヘルペスウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.99%以上
アデノウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.99%以上
風疹ウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.99%以上
麻疹ウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.0%以上
ムンプスウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.99%以上
インフルエンザウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.99%以上
ロタウイルス (サル)	10倍 (1.0%)	30秒	99.9%以上
ポリオウイルス	2倍 (5.0%)	30秒	99.9%以上
HIV	200倍 (0.05%)	30秒	99.9%以上
サイトメガロウイルス	10倍 (1.0%)	30秒	99.9%以上

ウイルス	10%ポビドンヨード液の希釈倍率 (PVP-I 濃度)	作用時間	ウイルス不活化率
SARS ウイルス	10倍 (1.0%)	60秒	99.99%以上
鳥インフルエンザウイルス (高病原性)	5倍 (2.0%)	10秒	99.99%以上
鳥インフルエンザウイルス (低病原性)	5倍 (2.0%)	10秒	99.99%以上
豚インフルエンザウイルス	10倍 (1.0%)	10秒	99.99%以上
カリシウイルス (ネコ、イヌ)	40倍 (0.25%)	10秒	99.9%以上
マウスノロウイルス	50倍 (0.2%)	15秒	99.99%以上

また、コクサッキーウイルス、エコーウイルス、エンテロウイルスに対しても効果が認められた<sup>19)、20)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ポビドンヨード (Povidone-Iodine)

化学名：Poly[1-(2-oxopyrrolidin-1-yl)ethylene]iodine


分子式：(C<sub>6</sub>H<sub>9</sub>NO)<sub>n</sub> · xI

性状：暗赤褐色の粉末で、わずかに特異なおいがある。

水又はエタノール (99.5) に溶けやすい。

本品 1.0g を水 100mL に溶かした液の pH は 1.5~3.5 である。

化学構造式：



## 20. 取扱い上の注意

直射日光を避けて保存すること。

## \*22. 包装

15mL [多層ラミネートフィルム製容器×500 包入]、250mL [ポリ容器]、500mL [ポリ容器]、2L [ポリ容器]

## 23. 主要文献

- 1) Danziger Y., et al. : Arch Dis Child. 1987 ; 62 : 295-296
- 2) 大塚春美 他 : 第30回日本新生児学会総会学術集会プログラム. 1994 ; 328
- 3) 北村 隆 他 : Progress in Medicine. 1987 ; 7 (5) : 1031-1034
- 4) 竹内 敏 他 : 日本小児外科学会雑誌. 1994 ; 30 (4) : 749-754
- 5) Bar-Or D., et al. : Lancet. 1981 ; 2 (8246) : 589
- 6) Okano M. : J Am Acad Derm. 1989 ; 20 (5) : 860
- 7) 小室順義 他 : 産科と婦人科. 1985 ; 52 (10) : 1696-1702
- 8) 社内資料：殺菌力試験 (Dat01-001)
- 9) 国定孝夫 他 : 環境感染. 1999 ; 14 (2) : 142-147
- 10) 国定孝夫 他 : 環境感染. 2000 ; 15 (2) : 156-162
- 11) Rikimaru T., et al. : Dermatology. 1997 ; 195 (Suppl. 2) : 104-106
- 12) Suzuki T., et al. : J Infect Chemother. 2012 ; 18 (2) : 272-275
- 13) 川名林治 他 : 臨床とウイルス. 1998 ; 26 (5) : 371-386
- 14) Kariwa H., et al. : Dermatology. 2006 ; 212 (Suppl. 1) : 119-123
- 15) Ito H., et al. : Dermatology. 2006 ; 212 (Suppl. 1) : 115-118
- 16) 伊藤啓史 他 : 日本化学療法学会雑誌. 2009 ; 57 (6) : 508-510
- 17) 遠矢幸伸 他 : 日本化学療法学会雑誌. 2006 ; 54 (3) : 260-262

- 18) Matsuhira T., et al. :Exp Anim. 2012 ; 61 (1) : 35-40  
19) 栗村 敬 他 :Biomedica. 1987 ; 2 (12) : 1223-1226  
20) 野田伸司 他 : 岐衛研所報. 1979 ; 24 : 15-21

#### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

兼一薬品工業株式会社 医薬情報室

〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

TEL 06-6471-3548

FAX 06-6471-5659

#### 26. 製造販売業者等

##### 26.1 製造販売元

兼一薬品工業株式会社

〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号