


日本薬局方

サフラン 3g

第3類医薬品

 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	軟便、下痢

- 長期連用する場合には医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

▲ 用法及び用量


大人(15歳以上)は一日量 0.3gにつき熱湯 100~150mL を加え、5~10分後にそのまま服用する。1日3回、食前又は食間に服用する

▲ 効能又は効果

冷え性、血色不良

▲ 保管及び取扱上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない、涼しいところに保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください
- 開封後はなるべく早く服用し、長く放置しないでください
- 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください
- 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようにご注意ください
- 服用に際しては説明文をよくお読みください



4

吉見製薬株式会社
大阪市中央区船越町2-1-17

使用期限：

LOT: