

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要ときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

# 越婢加朮 粒状

(えっぴかじゅつ)

## 製品の特徴

本剤は、黄褐色の顆粒で、微に芳香があり、辛味と渋味があります。




## 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。

 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。 排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

3. 1ヵ月くらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

腎炎、ネフローゼ、脚気による浮腫

## 用法・用量

大人は1回に1.5gずつ、1日3回食前または食間に、水または温湯にて服用してください。  
小児用量は大人用量を1とするとき、

15歳以下8歳まで	1/2量	4歳以下2歳まで	1/6量
7歳以下5歳まで	1/3量	1歳以下	1/12量

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分・分量

本剤は大人1日の服用量4.5g中に次の成分を含んでいます。

日局マ オ ウ	.....1.0g	日局ピャクジュツ	.....1.2g
日局セ ッ コ ウ	.....0.8g	日局マ オ ウ	.....1.0g
日局ショウキョウ	.....0.6g	日局タイソウ	.....3.0g
日局カンゾウ	.....0.5g	水溶性乾燥エキス	.....0.4g

}に対応する

## 保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った用方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

## その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、顆粒の色調などが多少異なることがありますが、効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16

長倉の漢方薬