

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2 類医薬品

W. T. T. C.® 粒状

(ダブリュー・ティー・ティー・シー)

製品の特徴

本剤は、灰黒色の顆粒で、特有のにおいがあり、苦味があります。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月くらい服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

消炎、排膿、利尿、浮腫、関節のはれや痛み、化膿症、鎮痛、鎮痙

用法・用量

大人は1回に2.0gずつ、1日3回食前30分か食間に、水または白湯にて服用してください。
小児用量は大人用量を1とするとき、

15歳以下8歳まで	1/2量	4歳以下2歳まで	1/6量
7歳以下5歳まで	1/3量	1歳以下	1/12量

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量6.0g中に次の成分を含んでいます。

フジの瘤	15g	} の混合水溶性軟稠エキス6.0g
局外生規ヒシノミ	15g	
局外生規カシ	15g	
日局ヨクイニン	15g	
日局ヨクイニン末	適量	

保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った用い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、顆粒の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



製造販売元

長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16

長倉の漢方薬